



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

«30» января 2020 г.

№ 10

г. Алматы

**О единых методах определения сортовых качеств
семян сельскохозяйственных растений в рамках
Евразийского экономического союза**

В целях реализации статьи 5 Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза от 7 ноября 2017 года и обеспечения применения единых методов определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза Совет Евразийской экономической комиссии **решил**:

1. Утвердить прилагаемые:

метод полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений;

метод грунтового контроля сельскохозяйственных растений.

2. Установить, что до 1 января 2022 г. допускается выдача документов, содержащих сведения о сортовых качествах семян сельскохозяйственных растений, по формам, установленным в соответствии с законодательством государств – членов Евразийского экономического союза.

Указанные документы действительны до использования партии семян, на которую они были выданы.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 г.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:



УТВЕРЖДЕН

Решением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 30 января 2020 г. № 10

МЕТОД
полевой апробации сортовых посевов (посадок)
сельскохозяйственных растений

I. Общие положения

1. Настоящий документ разработан в соответствии с подпунктом 13 пункта 7 статьи 95 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьей 5 Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза от 7 ноября 2017 года (далее Соглашение), на основе лучших практик международных организаций и устанавливает единые требования при определении в государствах – членах Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) показателей сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений методом полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений.

2. Настоящий документ применяется при проведении сортовой идентификации сортовых посевов (посадок) зерновых, зернобобовых, крупяных, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, овощных, бахчевых, лекарственных культур и картофеля для установления пригодности их урожая на семенные цели.

II. Основные понятия

3. Для целей настоящего документа используются понятия, которые означают следующее:

«апробатор» – физическое лицо, уполномоченное в порядке, установленном законодательством государства-члена, на проведение полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений;

«апробационные признаки» – совокупность существенных морфологических признаков сельскохозяйственных растений, характеризующих их принадлежность к определенному сорту;

«биологическое засорение сорта» – засорение сорта сельскохозяйственного растения в результате естественного переопыления разных сортов или возникновения мутаций;

«видовая чистота» – отношение числа стеблей аprobируемого сельскохозяйственного растения к общему числу стеблей аprobируемого вида сельскохозяйственного растения и других видов сельскохозяйственных растений;

«журнал полевого обследования» – таблица учета данных (результатов) полевой аprobации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений;

«заявитель» – юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на проведение полевой аprobации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений в организацию государства-члена, осуществляющую в соответствии с законодательством государства-члена деятельность по оказанию услуг на проведение полевой аprobации (полевой инспекции) сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений;

«механическое засорение сорта» – засорение сорта сельскохозяйственного растения семенами других сортов сельскохозяйственных растений и (или) иных видов сельскохозяйственных растений, происходящее во время посева (посадки), уборки, очистки и других технологических процессов;

«национальный реестр» – реестр сортов сельскохозяйственных растений, допущенных (разрешенных, рекомендуемых) к использованию на территории государства-члена, формируемый в соответствии с законодательством государства-члена;

«оригинальные семена (ОС) (дабазовые семена)» – семена сельскохозяйственных растений, произведенные оригиналатором сорта сельскохозяйственных растений или уполномоченным им лицом в порядке, установленном законодательством государства-члена;

«оригинатор сорта» – физическое или юридическое лицо государства-члена, которое создало, вывело, выявило сорт сельскохозяйственного растения и (или) обеспечивает его сохранение и данные о котором внесены в национальный реестр;

«официальное описание сорта» – документ (перечень сведений), содержащий описание существенных признаков сорта сельскохозяйственного растения, определяемых организацией, осуществляющей в соответствии с законодательством государства-члена испытание сортов сельскохозяйственных растений по критериям отличимости, однородности и стабильности сорта сельскохозяйственного растения;

«полевая апробация сортовых посевов (посадок)» – обследование (полевая инспекция) сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений с целью определения (оценки) сортовых качеств (видовой чистоты, сортовой чистоты, сортовой типичности), засоренности их

иными видами растений, пораженности болезнями и поврежденности вредителями сельскохозяйственных растений и установления соответствия сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений официальному описанию сорта, с оформлением результатов обследования;

«пробный участок» – часть сортового посева (посадки) сельскохозяйственных растений, на котором проводится осмотр растений для определения значения признаков сортовых качеств семян;

«пространственная изоляция» – минимально допустимые нормы расстояния между посевами (посадками) различных сортов и видов перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных растений, а также использование различных изолирующих устройств или культур, разделительных полос для предотвращения переопыления сельскохозяйственных растений;

«репродукционные семена (РС) (сертифицированные семена)» – семена сортов сельскохозяйственных растений, полученные от последовательного размножения элитных семян (первое и последующие поколения, число которых определяется в соответствии с законодательством государства-члена);

«репродукционные семена для производства товарной продукции (РСт)» – семена сортов сельскохозяйственных растений, полученные от последовательного размножения репродукционных семян и предназначенные исключительно для производства товарной продукции;

«сорт» – группа сельскохозяйственных растений в рамках низшего из ботанических таксонов, которая определяется по степени выраженности признаков, характеризующих данный генотип или комбинацию генотипов, отличается от других групп

сельскохозяйственных растений того же ботанического таксона одним или несколькими признаками либо степенью выраженности признаков и является стабильной. Категориями сорта являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция и другие категории сорта, используемые в сельскохозяйственном производстве;

«сортовой посев (посадка)» – поле (участок), засеянное семенами сорта сельскохозяйственного растения, сортовая принадлежность которого подтверждена документами на семена и предназначенный для получения сортовых семян;

«сортовая типичность» – показатель сортовой чистоты перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных растений;

«сортовая чистота» – отношение числа растений (стеблей) основного сорта сельскохозяйственных растений к общему количеству обследованных развитых растений (стеблей) на пробных участках апробируемого сельскохозяйственного растения, выраженное в процентах;

«сортовые качества семян» – совокупность признаков, характеризующих принадлежность семян сельскохозяйственных растений к определенному сорту;

«специальный пробный участок» – часть посева (посадки) сельскохозяйственных растений, предназначенная для наблюдения за опылением при производстве семян гибридных сортов первого поколения;

«элитные семена (ЭС) (базовые семена)» – семена, полученные от последовательного размножения оригинальных семян согласно схемам их производства, устанавливаемым в соответствии с законодательством государства-члена.

Иные понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных Соглашением и актами органов Союза, принятыми в его реализацию.

III. Общие требования при проведении полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений
(далее соответственно – апробация, сортовые посевы (посадки))

1. Требования к сортовым посевам (посадкам)

4. Требования к сортовым посевам (посадкам) включают в себя:

посев (посадка) чистосортными семенами;

соблюдение норм пространственной изоляции сортовых посевов (посадок) и (или) наличие разделительной полосы (за исключением сортовых посевов (посадок), предназначенных для выращивания семян в культуре *in vitro*);

исключение возможности механического засорения сорта семенами трудноотделимых сельскохозяйственных растений на всех этапах семеноводства;

исключение возможности засорения сортовых посевов (посадок) трудноотделимыми, злостными, ядовитыми и карантинными сорными растениями;

исключение возможности заражения сортовых посевов (посадок) болезнями, передаваемыми через семена;

соблюдение технологий производства семян (включая схемы производства гибридных семян), установленных оригиналатором сорта (соотношение мужских и женских растений на участках гибридизации);

соблюдение по предшествующим культурам минимального интервала времени между посевами (посадками) сельскохозяйственного растения одного и того же вида, и любого другого

сельскохозяйственного растения того же вида, которое должно составлять для зерновых, зернобобовых культур и кукурузы – не менее двух лет, для крестоцветных, кормовых, масличных культур, злаковых и бобовых трав – не менее пяти лет, льна и подсолнечника – не менее семи лет, прочих сельскохозяйственных растений – не менее одного года.

2. Действия аprobатора

5. Аprobатор должен:

а) получить от заявителя и проверить следующие сведения:

о площади сортового посева (посадки), предназначеннай для аprobации;

о расположении сортового посева (посадки) в соответствии с картами полей;

об истории посевов (посадок) на подлежащей аprobации площади сортового посева (посадки) (в соответствии с абзацем восьмым пункта 4), включающей информацию о предшественнике (предшественниках) сортового посева (посадки), севообороте сельскохозяйственных растений на данной площади;

о семенах, использованных для посева (посадки), подтверждаемые документом, содержащим сведения о сортовых и посевных (посадочных) качествах семян (с указанием в случае приобретения семян даты приобретения семян, наименования юридического или физического лица, у которого были приобретены (получены) семена, номер договора между поставщиком и покупателем семян, срока его действия);

о других сортах аprobируемого сельскохозяйственного растения, их наименовании и площади посева (посадки);

- о применении гербицидов;
- о направлении проб для проведения грунтового контроля (грунтовой оценки) сортов сельскохозяйственных растений (при наличии данного вида сельскохозяйственного растения в перечне сельскохозяйственных растений и категорий семян, в отношении которых оценка сортовых качеств семян методом грунтового контроля (грунтовой оценки) является обязательной в соответствии законодательством государства-члена);
- б) иметь в распоряжении основные сведения об апробируемом сорте, включая официальное описание аprobационных признаков сорта или родительских компонентов гибрида, получаемое в уполномоченном органе (организации) государства-члена по проведению испытания сорта на отличимость, однородность и стабильность (ООС) или из национального реестра;
- в) проверить:
- наличие указателя (этикетки) на краю поля, содержащего сведения о наименовании заявителя, названии рода, вида и наименовании сорта сельскохозяйственного растения, категории (поколения, репродукции) высеванных семян сельскохозяйственного растения, площади сортового посева (посадки);
 - наличие у заявителя документов, подтверждающих право на использование сорта сельскохозяйственного растения, являющегося объектом правовой охраны в соответствии с законодательствами государств-членов (далее – охраняемого сорта);

соблюдение норм пространственной изоляции посевов (посадок) сельскохозяйственных растений;

наличие примесей других сортов апробируемого вида сельскохозяйственных растений;

наличие в сортовом посеве (посадке) карантинных объектов в соответствии с перечнем, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158;

наличие в сортовом посеве (посадке) трудноотделимых сельскохозяйственных растений, трудноотделимых, злостных, ядовитых сорных растений, пораженность сортового посева (посадки) болезнями и вредителями.

6. Результаты обследования сортового посева (посадки) аprobатор вносит в журнал полевого обследования (формы журнала полевого обследования всех сортовых посевов (посадок), за исключением сортовых посевов (посадок) гибридов первого поколения, и журнала полевого обследования сортовых посевов (посадок) гибридов первого поколения приведены в приложениях № 1 и 2 к настоящему документу (далее – приложения № 1 и 2) и на их основе оформляет акт аprobации (полевой инспекции) (форма акта аprobации (полевой инспекции)) приведена в приложении № 3 к настоящему документу).

7. При аprobации смешанных посевов сельскохозяйственных растений, производство семян которых требует использования поддерживающих растений, аprobация проводится по каждому компоненту смеси отдельно с оформлением журнала полевого обследования и акта аprobации (полевой инспекции) на каждый компонент смеси. В указанных документах делается отметка «Производство семян в смешанном посеве».

IV. Этапы проведения аprobации сортовых посевов (посадок)

1. Общие требования к этапам аprobации сортовых посевов (посадок)

8. Аprobация сортовых посевов (посадок) проводится в несколько этапов:

предварительное обследование сортовых посевов (посадок);

окончательное обследование сортовых посевов (посадок).

9. В зависимости от биологических особенностей сельскохозяйственного растения и состояния сортового посева (посадки) в период вегетации может проводиться несколько предварительных обследований.

10. Подтверждение принадлежности высеванных семян заявленному сорту и происхождения высеванных семян обеспечивается заявителем посредством предоставления аprobатору документов, содержащих сведения о сортовых и посевных (посадочных) качествах семян.

11. Дополнительным подтверждением сведений о заявлении сорте высеванных семян является предоставляемая заявителем тарная этикетка от партии высеванных семян, на которой в обязательном порядке указывается название рода и вида сельскохозяйственного растения, наименование сорта, категория (этап воспроизводства сорта, этап размножения семян, репродукция), год урожая, номер партии и происхождение семян.

12. В случае если репродукционные семена (РС) и репродукционные семена для производства товарной продукции (РСт) хранились насыпью, представляется этикетка, которая была размещена на указателе (табличке), устанавливаемом на партии семян в хранилище семян сельскохозяйственных растений при их хранении.

13. В случае невозможности идентификации сорта в процессе аprobации аprobатор может получить дополнительную информацию о проявлении сортовых признаков сорта или гибрида на участках грунтового контроля.

14. При аprobации участков гибридизации проверяется сортовая идентичность каждого родительского компонента гибридного сорта (отцовской и материнской форм) с использованием официального их описания в национальном реестре сортов сельскохозяйственных растений.

15. При необходимости на сортовых посевах (посадках) проводятся видовые, сортовые прополки и фитопатологические прочистки с составлением по их результатам соответствующего акта в произвольной форме с включением сведений о наличии в посевах (посадках) карантинных сорных растений, трудноотделимых сорных и культурных растений, примеси других сортов, больных растений, с указанием сроков их удаления. В актах аprobации (полевой инспекции) сортовых посевов (посадок) указываются данные о примесях, удаленных при сортовой прополке.

Видовые, сортовые прополки и фитопатологические прочистки проводятся на сортовых посевах (посадках) однолетних, двулетних и многолетних сельскохозяйственных растений в течение вегетации растений (во все фазы вегетации) до аprobации сортовых посевов (посадок), по мере обнаружения видовых и сортовых примесей и растений, пораженных болезнями и поврежденных вредителями.

Сортовые прополки у перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных растений проводят до фазы цветения.

16. После обследования апробируемого посева (посадки) в целом, аprobator переходит к его подробному исследованию, включая периметр участка, на котором размещен посев (посадка).

17. В процессе обследования сортового посева (посадки) отмечаются все возможные причины его механического и (или) биологического засорения.

18. При исследовании периметра участка, на котором размещен сортовой посев (посадка) устанавливается соблюдение норм пространственной изоляции для перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных растений и наличие разделительной полосы для других сельскохозяйственных растений. Для получения информации о возможных источниках посторонней пыльцы заявитель предоставляет аprobатору карту полей.

19. Для сортовых посевов (посадок) перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных растений требуется соблюдение норм пространственной изоляции (с учетом способа опыления растений (естественное опыление – ветром или насекомыми, искусственное опыление, склонности растений к самоопылению и т.д.)), особенностей сорта по его биологическим и хозяйственным характеристикам, особенностей места выращивания растений (рельеф, наличие преград для пыльцы и т.п.).

Минимальные нормы пространственной изоляции между сортовыми посевами (посадками) должны соответствовать показателям, приведенным в таблице 1. Указанные минимальные нормы пространственной изоляции могут быть сокращены вдвое при наличии преград для переноса пыльцы.

**Минимальные нормы пространственной изоляции
между сортовыми посевами (посадками)**

Название сельскохозяйственного растения	Минимальная норма пространственной изоляции, метров, не менее
Арбуз	1000
Баклажан	150
Бобы кормовые	500
Бобы овощные	1000
Вика озимая	200
Горох сахарных и лущильных сортов	50
Горчица сарептская и белая	250
Гречиха	200
Донник белый и желтый	200
Дыня	1000
Клевер (луговой, гибридный, ползучий)	200
Кукуруза	
сорта	500 – для ОС; 200 – для ЭС, РС и РСт;
линии	500 – для ОС, ЭС, 200 – для РС и РСт
гибриды	200
Лен долгунец	10
Лен масличный	100
Ломкоколосник ситниковый (волоснец ситниковый)	400
Люпин белый	200
Люпин желтый	200
Люцерна	200
Лядвеен рогатый	200
Многолетние злаковые травы	400
Морковь	1000
Огурец	1000
Перец	150
Перекрестноопыляющиеся овощные сельскохозяйственные растения, не поименованные в иных строках настоящей таблицы	1000
Подсолнечник:	
родительские формы простых гибридов (линии)	5000
сорта, участки гибридизации	3000
Пшеница, ячмень, овес	1) размещение посевов твердой пшеницы от посевов мягкой пшеницы – 200; 2) для материнской родительской формы гибридов (за исключением посевов отцовской

Название сельскохозяйственного растения	Минимальная норма пространственной изоляции, метров, не менее
	родительской формы) – 25; 3) для гибридов: ОС, ЭС – 100; для РС и РСт – 50
Рапс озимый и яровой	250
Редька масличная	250
Рожь	1) между посевами сортов с доминантной низкостебельностью и высокостебельными сортами – 1000; 2) между посевами различных категорий одного сорта низкостебельной ржи – 200; 3) при производстве гибридов с использованием ЦМС: для ОС и ЭС – 1000, для всех остальных (без ЦМС) – 600, для РС – 500; 4) при производстве сортов для ОС, ЭС – 300, РС, РСт – 250; 5) для всех остальных посевов – 400
Рыжик	500
Свекла (сахарная, столовая, листовая, кормовая):	
многосемянная тетрапloidная (4x) и многосемянная дипloidная (2x)	5000
односемянная и многосемянная дипloidная (2x)	3000
односемянная и многосемянная тетрапloidная (4x)	3000
односемянная тетрапloidная (4x) и многосемянная дипloidная (2x)	5000
разные многосемянные сорта с одинаковой плодностью	1000
разные односемянные сорта с одинаковой плодностью	1000
семенники и сахарная свекла первого года жизни	1000
стерильная по пыльце, О-типы и фертильная (с нормальной пыльцой)	10000
Сорго:	
низкорослые гибриды и сорта (с высотой растений до 150 см)	500
высокорослые гибриды и сорта (с высотой растений 150 см и более)	1000
Сорго зерновое, все виды, включая алешинское (гумай)	300

Название сельскохозяйственного растения	Минимальная норма пространственной изоляции, метров, не менее
Суданская трава и мотар	500
Сурепница озимая и яровая	500
Томат	100
Тритикале:	
перекрестьоопыляемые сорта	для ОС и ЭС – 300; для РС – 250;
самоопыляемые сорта	ОС – 50; РС – 20;
родительские формы	для ОС (суперэлита) и ЭС – 500
Тыква	1000
Хлопчатник:	
сорта	100 – для ОС, ЭС; 30 – для РС;
гибриды первого поколения (F1), производимые без использования ЦМС	30
гибриды F1, производимые с использованием ЦМС	800
Эспарцет	200

20. Сведения о соблюдении норм пространственной изоляции сортовых посевов (посадок) апробатор указывает в журнале полевого обследования (приложения № 1 и 2).

21. Размещение сортовых посевов (посадок) (за исключением сортовых посевов (посадок), предназначенных для выращивания семян в культуре *in vitro* должно гарантировать недопустимость случайного их засорения при проведении технологических операций при посеве, уходе за посевом и уборке урожая.

22. Для сельскохозяйственных растений, размножаемых собственно семенами, размер разделительной полосы должен быть не менее удвоенной максимальной высоты растений, произрастающих в смежных посевах (посадках).

23. Для сельскохозяйственных растений, размножаемых вегетативными частями растений, разделительная полоса между посевами должна быть установлена с учетом длины столонов, размера

клубней, луковиц, корневищ и т.п. для исключения смешения семян в посеве и ухудшения их сортовых качеств.

24. При несоблюдении требований к пространственной изоляции или к разделительной полосе сортовой посев (посадка) признается непригодным на семенные цели, за исключением сортовых посевов (посадок) эфиромасличных, лекарственных растений, для которых в таком случае в акте аprobации (полевой инспекции) после названия сельскохозяйственного растения вместо наименования сорта проставляется «смесь», категория семян устанавливается «репродукционные семена», а этап воспроизводства – «последующая репродукция».

25. Аprobатор устанавливает на сортовом посеве (посадке) и на близлежащих участках наличие сорных растений или сельскохозяйственных растений, которые могут быть источником чужеродной пыльцы для опыления.

26. По результатам аprobации аprobатор устанавливает категорию (этап размножения, репродукцию) семян и этап воспроизводства сорта сельскохозяйственных растений на основании представленных ему документов на высеченные семена с учетом установленной в ходе аprobации сортовой чистоты сортового посева (посадки).

Участки гибридизации должны быть оценены с учетом соблюдения схемы производства гибридных семян, установленной оригиналатором сорта, сроков посева (посадки) родительских компонентов и требуемого уровня мужской стерильности растений материнского компонента.

27. Заявитель или его представитель вправе присутствовать при проведении аprobации сортовых посевов (посадок) на всех этапах.

При необходимости апробация сортовых посевов (посадок) на всех этапах проводится с участием оригинатора (автора) сорта или уполномоченного им лица.

28. Апробация сортовых посевов (посадок) охраняемых сортов сельскохозяйственных растений осуществляется в соответствии с законодательством государства-члена.

29. На сортовых посевах овощных культур проводится дополнительное обследование перед цветением семенников двулетних, многолетних культур, редиса и редьки летней.

30. При апробации сортовых посевов ржи, гречихи, люпина узколистного горького, вики мохнатой и паннонской сортовая чистота не устанавливается. Принадлежность к сорту, категория семян, этап воспроизведения сорта устанавливают по количеству лет репродукции сортовых семян на основании документов, содержащих сведения о сортовых качествах высеванных семян, по которым можно определить поколение (репродукцию) после выпуска семян элиты.

Апробируемый посев этих культур признают сортовым, если соблюдена пространственная изоляция (кроме люпина узколистного горького) и не установлено механическое смешение семян с другим сортом или несортовыми семенами.

В акте апробации (полевой инспекции) в графе «Сортовая чистота» проставляется слово «типичная» в подтверждение полной типичности сорта.

31. Апробацию сортовых посадок и микрорастений сортов картофеля, высаженных в вегетационных помещениях для получения мини-клубней и в первом полевом поколении из миниклубней проводят

в соответствии с разделом 7 ГОСТ 33996-2016 «Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества».

2. Первый этап апробации – предварительное обследование сортовых посевов (посадок)

32. Предварительное обследование сортовых посевов (посадок) проводится путем проверки:

документов о качестве и происхождении высеванных (высаженных) семян;

соблюдения правил ведения семеноводства (соблюдение севооборота, минимальных норм пространственной изоляции, схемы посева (посадки) для участков гибридизации);

степени общей засоренности сорняками, пораженности болезнями и поврежденности вредителями;

осмотра по периметру посева (посадки) и посева (посадки) в целом.

33. В ходе предварительного обследования аprobатор визуально устанавливает принадлежность аprobируемого сортового посева (посадки) к заявленному сорту (проводит сортовую идентификацию посева). Сортовая идентификация осуществляется в период вегетации, когда аprobационные признаки сорта наиболее выражены.

34. Аprobационные признаки сорта определяются в соответствии с официальным описанием сорта. При отсутствии официального описания сорта допускается использовать описание сорта, предоставленное его оригинаром.

Во внимание принимают аprobационные признаки, которые в период предварительного обследования имеют явную выраженность.

35. Видовую идентификацию проводят на основании обследования растений сортового посева (посадки) по признакам их видовой принадлежности.

36. Для проведения сортовой или видовой идентификации, или идентификации типичности гибридов аprobатор намечает линии прохода по посеву (посадке) согласно одной из схем осмотра сортового посева (посадки) во время предварительного обследования и для размещения пробных участков, приведенных в приложении № 4 к настоящему документу (далее – схема). Для определения однородности сортового посева (посадки) и принадлежности преобладающих растений сортового посева (посадки) к заявленному виду, сорту, гибридам аprobатор проходит по намеченным линиям, предусмотренным выбранной схемой и визуально осматривает растения.

37. Если количество растений сортового посева (посадки), подлежащих аprobации, менее 100, то при сортовой идентификации или идентификации типичности гибридов осматривают все растения сортового посева (посадки).

38. По результатам предварительного обследования сортового посева (посадки) аprobатор выдает (при необходимости) заявителю рекомендации о проведении мероприятий по сохранению и улучшению сортовых качеств семян, в которых указывает выявленные недостатки, сроки и способы их устранения (форма рекомендации приведена в приложении № 5 к настоящему документу).

39. Если недостатков по результатам предварительного обследования не выявлено или рекомендации о проведении мероприятий по сохранению и улучшению сортовых качеств семян выполнены своевременно и полностью, сортовой посев (посадка)

признается пригодным для окончательного обследования, о чем делается отметка в журнале полевого обследования (приложения № 1 и 2).

40. Сортовой посев (посадка) признается непригодным для аprobации и непригодным для использования на семенные цели в следующих случаях:

в сортовом посеве (посадке) на любом этапе аprobации обнаружены карантинные объекты или ядовитые сорные растения;

пространственная изоляция для перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных растений не соответствует показателям минимальных норм, приведенных в таблице 1 или отсутствует разделительная полоса между посевами (посадками) других сортов (за исключением сортовых посевов эфиромасличных и лекарственных культур в отношении которых в акте аprobации (полевой инспекции) после названия сельскохозяйственного растения вместо наименования сорта указывается «смесь», категория семян устанавливается «репродукционные семена (РС)», а этап воспроизводства – «последующая репродукция»);

для сельскохозяйственных растений, в отношении которых установлены требования к сортовой чистоте, количество растений, относящихся к заявленному сорту, составляет для самоопыляющихся сельскохозяйственных растений менее 80 растений на 100 обследованных растений, для перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных растений – менее 75 растений на 100 обследованных растений (за исключением сортовых посевов эфиромасличных и лекарственных культур в отношении которых в акте аprobации (полевой инспекции) после названия сельскохозяйственного растения вместо наименования сорта указывается «смесь», категория

семян устанавливается «репродукционные семена (РС)», а этап воспроизводства – «последующая репродукция»;

в сортовом посеве (посадке), содержащем менее 100 растений, выявлено хотя бы одно нетипичное заявленному сорту растение.

41. В случае выявления при предварительном обследовании сортовых посевов (посадок) нарушений севооборота, норм пространственной изоляции, засорения сорняками, поражения болезнями, повреждения вредителями в степени, при которой проведение видовых и сортовых прополок, фитопатологических прочисток является нецелесообразным, они признаются непригодными для апробации и (или) непригодными для использования на семенные цели, о чем делается соответствующая отметка в журнале полевого обследования (приложения № 1 и 2) и акте апробации (полевой инспекции) (приложение № 3 к настоящему документу).

3. Второй этап апробации – окончательное обследование

42. Второй этап апробации проводится после проведения предварительного обследования и признания сортового посева (посадки) пригодным для окончательного обследования.

43. Допускается проведение апробации одновременно с предварительным обследованием при условии соответствия сортового посева (посадки) требованиям к фитосанитарному состоянию, пространственной изоляции и однородности растений апробируемого сорта по апробационным признакам. При необходимости к апробации могут быть привлечены фитопатологи.

44. Окончательное обследование сортовых посевов (посадок) для определения сортовой чистоты, типичности посева (посадки)

проводится путем визуального обследования растений на корню на пробных участках.

45. Для проведения окончательного обследования сортового посева (посадки) аprobатор должен определить количество пробных участков и наметить их расположение в посеве (посадке).

46. При аprobации сортовых посевов (посадок) лекарственных, эфиромасличных культур выделение пробных участков не осуществляют, а обследованию подлежит весь сортовой посев (посадка).

47. Пробные участки для окончательного обследования намечают произвольно при обходе поля (участка) посева (посадки) по одной из схем, приведенных в приложении № 4 к настоящему документу или иным образом так, чтобы они как можно более полно охватывали всю площадь сортового посева (посадки). Отступление от краев поля (участка) сортового посева (посадки) в глубину поля (участка) должно быть не меньше, чем ширина захвата уборочного агрегата.

48. При выборе мест размещения пробных участков допускается предварительно отмечать их длинными вешками (высотой 1,5 – 2,0 м), которые для наглядности обозначаются яркой краской, цветными лентами, флагами и (или) иными способами.

49. Размер пробного участка в случае узкорядного посева должен быть 10 м² и обеспечивать удобную и достоверную оценку растений.

50. Для оценки растений используются следующие размеры пробного участка: длина 5 м, ширина 2 м, позволяющие обеспечить доступ к каждой точке пробного участка без существенного повреждения расположенных на нем растений.

51. Для сельскохозяйственных растений, выращиваемых широкорядным способом (капуста, морковь, свекла, томат, огурец,

тыква и другие), в случае, если густота стояния растений (стеблей) в сортовом посеве (посадке) составляет менее 200 000 растений (стеблей) на 1 гектаре (далее – га), аprobатору необходимо определить пробные участки на рядках сортового посева (посадки) длиной по 20 погонных метров каждый. Пробные участки в таком случае размещаются равномерно по наиболее длинной диагонали сортового посева (посадки).

Например, при посадке капусты белокочанной по схеме 70x70 см на 20 погонных метров ряда будет приходиться около 30 растений, соответственно на 10 пробных участках количество обследованных растений составит 300 штук.

52. Количество пробных участков на обследуемом сортовом посеве (посадке) должно быть не менее 10, если его площадь не превышает 50 га. На каждые последующие полные или неполные 10 га, превышающие эту площадь, дополнительно выделяют один пробный участок.

Например, если площадь сортового посева (посадки) составляет 48 га, то достаточно выделить 10 участков. Если же площадь сортового посева (посадки) превышает 50 га, то на площади от 51 до 60 га оценку следует проводить на 11 участках, на площади от 61 до 70 га – на 12 участках, на площади от 71 до 80 га – на 13 участках.

53. В случае если площадь сортового посева (посадки) составляет менее 100 м², минимальное количество обследуемых растений должно быть не меньше четырехкратного количества растений, на которое, с учетом требований к сортовой чистоте сельскохозяйственных растений, может приходиться одно растение, нетипичное сорту, заявленному для аprobируемого сельскохозяйственного растения.

Например, при требуемом показателе сортовой чистоты не менее 99,9% одно нетипичное растение приходится на 1000 обследованных растений. Минимальное количество обследуемых растений в таком случае составит 4000 растений, при показателе сортовой чистоты не менее 99,7% – 1333 растения, при показателе сортовой чистоты не менее 99,5% – 800 растений, при показателе сортовой чистоты не менее 99,0% – 400 растений.

54. Апробацию сортовых посевов (посадок) проводят в фазы развития растений, указанные в таблице 2, когда проявление аprobационных признаков наиболее выражено. Для выявления растений других сортов и разновидностей (сортовых примесей) в апробируемом сортовом посеве (посадке) используются аprobационные признаки сельскохозяйственного растения. При определении аprobационных признаков сортов сельскохозяйственных растений в процессе аprobации аprobатор руководствуется признаками, установленными в методиках проведения испытаний сортов растений на отличимость, однородность и стабильность (OOC) соответствующего ботанического таксона, основанных на методиках Международного союза по охране новых сортов растений, и которые максимально выражены во время проведения аprobации.

Таблица 2

**Фазы развития сельскохозяйственных растений
в момент проведения аprobации**

Название сельскохозяйственного растения	Фаза развития растений в момент проведения аprobации
Анис обыкновенный	перед цветением и в период массового цветения
Арахис	уборочная спелость
Арбуз	при наступлении зрелости, выявлении сортовой окраски и образовании созревших

Название сельскохозяйственного растения	Фаза развития растений в момент проведения апробации
	семян у плодов на главной плети
Артишок	при технической спелости соцветий
Базилик огородный	перед цветением и в период массового цветения
Баклажан	при полной технической спелости и наличии биологической спелости плодов у 50% растений
Бамия	при наличии на растении плодов в технической спелости (молодые завязи) и единичных плодов в биологической спелости
Бобы кормовые	созревание нижних бобов
Бобы овощные	созревание нижних бобов
Брюква	при технической спелости корнеплодов
Вика посевная, яровая	два обследования: во время цветения; во время созревания бобов у основной части растений
Горох посевной и полевой (щеплюшка)	созревание нижних бобов
Горох сахарных и лущильных сортов	созревание нижних бобов
Горчица сарептская и белая	приобретение семенами первых нижних стручков свойственной сорту окраски
Гречиха	не ранее побурения половины семян на растениях
Душица	перед цветением и в период массового цветения
Дыня	при наступлении зрелости и выявлении сортовой окраски и сетки, и образовании созревших семян у плодов на главной плети
Иссоп	перед цветением и в период массового цветения
Кабачок, цуккини, патиссон	при полной технической спелости и наличии биологической спелости плодов у 50% растений
Капуста кочанная	кочан сформирован, достиг нормальных для сорта размера и плотности, кроющие листья приобрели некоторый блеск
Капуста брюссельская	при полном сформировании не менее 50% кочанчиков на растении
Капуста цветная, брокколи	при полном сформировании соцветий (головок), но не позднее расхождения их у единичных растений

Название сельскохозяйственного растения	Фаза развития растений в момент проведения аprobации
Капуста пекинская	полное сформирование розетки у листовых сортов или массового образования кочанов у кочанных сортов
Капуста листовая	при полном сформировании растений, когда единичные нижние листья начинают желтеть
Картофель, батат (сладкий картофель), топинамбур (подсолнечник клубненосный)	период цветения
Катран	в технической спелости корня
Кенаф	начало созревания первых коробочек у большинства растений
Клещевина	наступление уборочной спелости
Кольраби	при достижении стеблеплодом размера в диаметре 7–10 см
Копопля:	начало созревания единичных семян
двудомная	два обследования: в период бутонизации;
однодомная	в начале созревания единичных семян
Кориандр	два обследования: в технической спелости розетки листьев; перед цветением
Котовник	перед цветением и в период массового цветения
Кресс-салат	при технической спелости розетки листьев (начало отрастания цветоносного стебля у отдельных растений)
Кукуруза (за исключением кукурузы сахарной):	
сорта, гибридные популяции, самоопыленные линии, простые и тройные гибриды, родительские формы	восковая спелость или начало полной спелости
участки гибридизации двойных, тройных, пятилинейных гибридов	начало цветения початков
участки гибридизации сортолинейных, межсортовых и простых гибридов фуражного использования	массовое цветение
Кукуруза сахарная	восковая спелость зерна
Кунжут	семена первых нижних коробочек приобрели свойственную им окраску
Лаванда	два обследования: в год закладки;

Название сельскохозяйственного растения	Фаза развития растений в момент проведения апробации
	во второй год жизни после ремонта во время цветения
Лафант аписовый	перед цветением и в период массового цветения
Лен-долгунец	от зеленой до ранней желтой спелости льна, бутонизация, цветение, ранняя желтая спелость
Лен масличный	наступление хозяйственной спелости, стадия созревания – желтая
Листовая горчица	при технической спелости розетки листьев (начало отрастания цветоносного стебля у отдельных растений)
Лук-батун, лук-порей	при полной технической спелости
Лук репчатый	два обследования: при полном сформировании луковиц (начало подсыхания шейки и наружных чешуй); во время цветения
Люпин белый	начало цветения
Люпин желтый и узколистный	начало цветения
Майоран	перед цветением и в период массового цветения
Мангольд	при полной технической спелости
Маш	созревания нижних бобов
Мелисса лимонная	перед цветением и в период массового цветения
Морковь	два обследования: при технической спелости корнеплодов; во время цветения
Мята	перед цветением и в период массового цветения
Нут	созревания нижних бобов
Овес	начало восковой спелости
Огурец	при полной технической спелости и наличии биологической спелости плодов у 50% растений
Пастернак	при полной технической спелости
Перец	при полной технической спелости и наличии биологической спелости плодов у 50% растений
Петрушка	при полной технической спелости
Подсолнечник	созревание основной массы корзинок

Название сельскохозяйственного растения	Фаза развития растений в момент проведения аprobации
Просо	после появления окраски цветочных пленок в верхней части метелок
Пшеница и ячмень	начало восковой спелости
Рапс и сурепница	семена первых нижних стручков приобрели свойственную сорту окраску
Ревень	при технической спелости розетки листьев (начало отрастания цветоносного стебля у отдельных растений)
Редис	при технической спелости корнеплодов
Редька	при полной технической спелости корнеплодов
Репа	при технической спелости корнеплодов
Рис	начало полной спелости
Руккола	при технической спелости розетки листьев (начало отрастания цветоносного стебля у отдельных растений)
Рожь	молочная или восковая спелость
Рыжик	семена первых нижних стручков приобрели свойственную сорту окраску
Салат кочанный	при массовом образовании кочанов не менее чем у 75% растений
Салат листовой	при технической спелости розетки листьев (начало отрастания цветоносного стебля у отдельных растений)
Салатный цикорий	два обследования: при полном сформировании корнеплодов и листовой розетки; при выгонке в зимний период – когда кочанчик хорошо сформирован (плотный, удлиненный)
Сафлор	начало созревания семян
Свекла сахарная	начало созревания семян
Свекла столовая, листовая, кормовая	два обследования: при технической спелости корнеплодов во время цветения
Сельдерей	при полной технической спелости
Сорго	начало созревания семян
Соя	созревание нижних бобов
Спаржа	при технической спелости молодых побегов
Тимьян	перед цветением и в период массового цветения
Тмин	побурение плодов на центральном зонтике, в фазе технической спелости розетки листьев

Название сельскохозяйственного растения	Фаза развития растений в момент проведения аprobации
	(начало отрастания цветоносного стебля у единичных растений)
Томат	при наличии спелых плодов у 20 – 50% растений
Травы кормовые бобовые	массовое цветение
Травы кормовые злаковые	колошение
Тритикале	восковая спелость
Турнепс	при полной технической спелости
Тыква	при наступлении зрелости и выявления сортовой окраски, и образовании созревших семян у плодов на главной пласти
Укроп	два обследования: при технической спелости; при побурении семян в центральном зонтике
Фасоль обыкновенная	созревание нижних бобов
Фасоль овощная и лима	созревание нижних бобов
Фенхель	два обследования: в технической спелости розетки листьев; перед цветением
Хлопчатник	два обследования: во время цветения, после удаления растений – опылителей; в конце стадии цветения, в начале созревания коробочек
Хрен	при технической спелости корня
Цикорий корневой	при полной технической спелости
Чеснок	два обследования: при полном формировании луковиц (начало подсыхания шейки и наружных чешуй); во время цветения
Чечевица пищевая	созревание нижних бобов
Чина посевная	созревание нижних бобов
Шалфей мускатный	массовое цветение, техническая спелость розетки листьев (начало отрастания цветоносного стебля у единичных растений)
Шпинат	при технической спелости розетки листьев (начало отрастания цветоносного стебля у отдельных растений)
Щавель	при технической спелости розетки листьев (начало отрастания цветоносного стебля у отдельных растений)
Ячмень	начало восковой спелости

55. В случае отсутствия в сортовом посеве (посадке) растений, явно отличающихся по аprobационным признакам от официального описания сорта, оценку по дополнительным признакам для сортовых семян категорий репродукционные семена (РС) и репродукционные семена для производства товарной продукции (РСт) допускается не проводить.

56. В случае явного отличия сортовых примесей по основным признакам, установленным в официальном описании аprobируемого сорта, оценку растений аprobируемого сорта по дополнительным признакам не проводят для семян всех категорий.

57. В ходе окончательного обследования сортового посева (посадки) каждый пробный участок обходят по периметру, тщательно осматривают и подсчитывают отдельно только те продуктивные (развитые) растения или их стебли, по которым определяется соответствие сортовых качеств сортовых посевов (посадок):

растения или стебли основного сорта аprobируемого сельскохозяйственного растения;

растения или стебли сортовых примесей заявленного к аprobации сельскохозяйственного растения;

растения или стебли других сельскохозяйственных растений, в том числе трудноотделимых;

растения или стебли сорных растений, в том числе трудноотделимых;

растения или стебли ядовитых сорных растений;

растения или стебли злостных сорных растений;

растения или стебли основного сорта, пораженные болезнями;

растения или стебли основного сорта, поврежденные (заселенные) вредителями.

58. Максимальные нормы засоренности сортовых посевов (посадок) трудноотделимыми видами сорных растений и трудноотделимыми видами сельскохозяйственных растений приведены в таблице 3.

Таблица 3

Максимальные нормы засоренности сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений трудноотделимыми видами сорных растений и трудноотделимыми видами сельскохозяйственных растений

Название сельскохозяйственного растения	Максимальные нормы засоренности, %, не более			
	трудноотделимыми сорными растениями		трудноотделимыми сельскохозяйственными растениями	
	название	%, не более	название	%, не более
1	2	3	4	5
Анис обыкновенный	щетинник сизый, щетинник зеленый, подмарениник цепкий	3%	кориандр, укроп	0,5%
Бобовые травы другие (не поименованные в иных сроках таблицы 3)	марь белая, щавель маленький, звездчатка развилистая, дрема беловатая, ромашка непахучая, ширинца запрокинутая, герань маленькая	в ОС и ЭС – 3%; в РС1 – РС3, РСт – 7%	другие сельскохозяйственные растения и дикие виды бобовых трав	в ОС и ЭС – 2%; в РС1, РС2, РС3, РСт – 3%
Горох посевной	–	–	пелюшка, вика	в ОС и ЭС примесь пелюшки не допускается; в РС1 и РС2 – 0,5%; в РС3 и РСт – 1%; суммарно вики и пелюшки – 3 %

Название сельскохозяйственного растения	Максимальные нормы засоренности, %, не более			
	трудноотделимыми сорнями растениями		трудноотделимыми сельскохозяйственными растениями	
	название	%, не более	название	%, не более
1	2	3	4	5
Горох полевой	—	—	горох посевной	в ОС и ЭС – не допускается
Горчица белая	горчица полевая, сурепка обыкновенная, редька дикая, подмаренник цепкий	5%	рапс, горчица сарептская, просо, плодоносящие растения редьки, капусты, редиса	3%
Горчица сарептская	горчица полевая, сурепка обыкновенная, редька дикая, подмаренник цепкий	5%	рапс, горчица белая, просо, плодоносящие растения редьки, капусты, редиса	3%
Гречиха	гречиха татарская, редька дикая, гречинка вьюнковая	в ОС – не допускается; в ЭС – 0,1%; в РС1 – 0,2%; в РС2 и РС3 – 0,3%, в РС – 0,5%	шпеница, ячмень, тритикале	в ОС – не допускается; в ЭС – 0,2%; в РС1 – 0,2%; в РС2-3 – 0,5%; в РС4 и последующие – 0,5 %
Злаковые травы другие (не поименованные в иных строках таблицы 3)	фиалка полевая, марь белая, щавель воробышний, торица обыкновенная, незабудка полевая, черноголовка обыкновенная, подмаренник мягкий, звездчатка средняя, ромашка непахучая, метлица обыкновенная, тысячелистник, поповник	ОС и ЭС – 3%, в РС1, РС2, РС3 и РСт – 7%	другие виды трав	ОС и ЭС – 2%, в РС1, РС2, РС3 и РСт – 3%
Клевер гибридный	марь белая, щавель маленький, звездчатка	в ОС и ЭС – 3%; в РС1, РС2, РС3	другие сельскохозяйственные растения и	в ОС и ЭС – 2%, в РС1, РС2, РС3 и РСт – 3%

Название сельскохозяйственного растения	Максимальные нормы засоренности, %, не более			
	трудноотделимыми сорными растениями		трудноотделимыми сельскохозяйственными растениями	
	название	%, не более	название	%, не более
1	2	3	4	5
	развиллистая, дрема беловатая, ромашка непахучая, щирица запрокинутая, герань маленькая	и РСт – 7%	дикые виды бобовых трав тимофеевка	в ОС и ЭС – 2%; в РС1, РС2, РС3 и РСт – 3%
Клевер луговой	марь белая, щавель маленький, звездчатка развиллистая, дрема беловатая, ромашка непахучая, щирица запрокинутая, герань маленькая	в ОС и ЭС – 3%; в РС1, РС2, РС3 и РСт – 7%	другие сельскохозяйственные растения и дикые виды бобовых трав	в ОС – 1%; в ЭС – 2%; в РС1, РС2, РС3 и РСт – 3%
Клевер ползучий	марь белая, клевер пашенный, звездчатка средняя, дрема беловатая, щавель воробышний, подорожник большой, герань маленькая, щирица запрокинутая, подмаренник мягкий	ОС и ЭС – 3%; в РС1, РС2, РС3 и РСт – 7%	другие сельскохозяйственные растения и дикие виды бобовых трав тимофеевка	в ОС и ЭС – 2%; в РС1, РС2, РС3 и РСт – 3%
Клещевина	–	–	дурнишник	3%
Конопля:				
однодомная	дикая конопля	5%	обычная посконь	3%
южная	дикая конопля	5%	среднерусская конопля	3%
южная созревающая	дикая конопля	5%	среднерусская и южная конопля	3%
Кориандр	гречишка выюновая, подмаренник цепкий, мышай, просо куриное	3%	анис, укроп	5%

Название сельскохозяйственного растения	Максимальные нормы засоренности, %, не более			
	трудноотделимыми сорными растениями		трудноотделимыми сельскохозяйственными растениями	
	название	%, не более	название	%, не более
1	2	3	4	5
Лен масличный, лендолгунец	гумай	3%	—	—
Люпин желтый, белый и узколистный	—	—	примесь алкалоидных семян в ОС и ЭС – 0,5%, в РС – 3%, у горького люпина – не нормируется	
Люцерна посевная	подорожник ланцетолистный, морковь дикая, щетинник сизый и зеленый, щирица, марь белая и многосемянная, сурепница, просо колосовидное	в ОС и ЭС – 3%; в РС1, РС2, РС3 и РСт – 7%	другие сельскохозяйственные растения и дикие виды бобовых трав	в ОС – 1%; в ЭС – 2%; в РС1, РС2, РС3 и РСт – 3%
Мята	дикорастущие виды мяты	—	длиннолистная мята, драголоб, приднестровская мята	—
Овес	овсяног, овес щетинистый и триходесма седая	в ОС не допускается; ЭС – 0,1%; РС1 – 0,2%; РС2-3 – 0,3%; РС последующие и РСт – 0,5%	ячмень, рожь пшеница, тритикале	в ОС – не допускается; ЭС – 0,2%; РС1 – 0,2%; РС2-3 – 0,5%; последующие – 0,5%
Просо	щетинник сизый, тысячеголов, гумай, просо рисовое и крупноплодное, синеглазка, гелиотроп волосистый (опущенный), просо куриное, выонок полевой, вязель разноцветный	в ОС – не допускается; в ЭС – 0,1%; в РС1 – 0,2%; в РС2 и РС3 – 0,3%; в РС последующих и РСт – 0,5%; общее (в сумме) засорение всеми трудноотделимыми сорными растениями –	—	—

Название сельскохозяйственного растения	Максимальные нормы засоренности, %, не более			
	трудноотделимыми сорными растениями		трудноотделимыми сельскохозяйственными растениями	
	название	%, не более	название	%, не более
1	2	3	4	5
		3%		
Пшеница	софора лисохвостная, софора толстоплодная, головчатка сирийская, синеглазка, гречиха татарская	в ОС – не допускается; в ЭС – 0,1%; в РС1 – 0,2%; в РС2 и РС3 – 0,3%; в РС – 0,5% последующих и РСт – 0,5%; общее (в сумме) засорение посева всеми трудноотделимыми сорными растениями – 3%	в яровой – ячмень, гречиха, тритикале; овес, в осимой – рожь, ячмень, тритикале	в ОС – не допускается; в ЭС – 0,2%; в РС1 – 0,2%; в РС2 и РС3 – 0,5%; в РС – 0,5%
Рапс	горчица полевая, сурепка обыкновенная, редька дикая, подмаренник цепкий	5%	сурепица, горчица сарептская, горчица белая, просо, редька масличная, капуста, редис, гречиха посевная	3%
Рис	остистые формы ежовника крупноплодного, просо рисовое, монокория Корсакова, просо куриное	не нормируются, в акте априбации делается отметка о засоренности	примесь краснозерных форм риса	в ЭС – не допускается, в РС1 и РС2 – 0,5%, в РС3 и РС – 1,0%
			пшеница, ячмень	не нормируется, в акте априбации делается отметка
Рожь	кострец ржаной, софора толстоплодная	в ОС – не допускается; в ЭС – 0,1%; в РС1 – 0,2%; РС2 и РС3 – 0,3%; в РСт – 0,5%	пшеница, ячмень, тритикале	в ОС – не допускается; в ЭС – 0,2%; в РС1 – 0,2%; РС2 и РС3 – 0,5%; в РСт – 0,5%
Рыжик	горчица полевая, сурепка	5%	рапс, горчица сарептская,	3%

Название сельскохозяйственного растения	Максимальные нормы засоренности, %, не более			
	трудноотделимыми сорнями растениями		трудноотделимыми сельскохозяйственными растениями	
	название	%, не более	название	%, не более
1	2	3	4	5
	обыкновенная, редька дикая, подмаренник цепкий		горчица блая, просо, редька масличная, капуста, редис	
Суданская трава	сурго алеппское (гумай)	в ОС и ЭС – 3%; в РС1, РС2, РС3 и РСт – 7%	сурго-суданковые гибриды, сурго других групп	в ОС и ЭС – 2%; в РС – 3%
Сурепница	горчица полевая, сурепка обыкновенная, редька дикая, подмаренник цепкий	5%	рапс, горчица сарептская, горчица белая, просо, плодоносящие растения рельки, капусты, редиса, ръжик	3%
Тимофеевка	фиалка полевая, марь белая, щавель воробышний, торица обыкновенная, незабудка полевая, черноголовка обыкновенная, подмаренник мягкий, звездчатка средняя, ромашка непахучая, метлица обыкновенная, тысячелистник, поповник	в ОС и ЭС – 3%; в РС1, РС2, РС3 и РСт – 7%	другие сельскохозяйственные растения и дикие виды бобовых трав	в ОС и ЭС – 2%; в РС1, РС2, РС3 и РСт – 3%
			клевер ползучий и гибридный	в ОС и ЭС – 2%; в РС1, РС2, РС3 и РСт – 3%
Тмин	–	–	фенхель, укроп	0,5%
Тритикале	овсяног, софора лисохвостная и толстоплодная, головчатка сирийская, гречиха татарская	в ОС – не допускается; в ЭС – 0,1%; в РС1 – 0,2%; в РС2 и РС3 – 0,3%; в РСт – 0,5%	шпеница, рожь, ячмень	в ОС – не допускается; в ЭС – 0,2%; в РС1 – 0,2%; в РС2, РС3 и РСт – 0,5%

Название сельскохозяйственного растения	Максимальные нормы засоренности, %, не более			
	трудноотделимыми сорнями растениями		трудноотделимыми сельскохозяйственными растениями	
	название	%, не более	название	%, не более
1	2	3	4	5
Фенхель	—	—	тмин, укроп	0,5%
Чечевица пищевая	—	—	вика плоско-семянная, софора лисохвостная и толстоплодная	в ОС и ЭС – не допускается; в РС1, РС2, РС3 – 2%; в РСт – не нормируется
Шалфей мускатный	мышей, гречишка, подмарениник, выонок	3%	—	—
Ячмень	овсяног, софора толстоплодная, синеглазка, дикая редька, триходесма седая	в ОС – не допускается; в ЭС – 0,1%; в РС1 – 0,2%; в РС2 и РС3 – 0,3%; в РСт – 0,5%	шпеница, овес, тритикале, рожь	в ОС – не допускается; в ЭС – 0,2%; в РС1 – 0,2%; РС2 и РС3 – 0,5%; в РСт – 0,5%

59. К злостным сорням относятся: гумай, софора лисохвостная, софора толстоплодная, сыть круглая, паспалюм двурядный, синеглазка, шерстяк волосистый, бодяк полевой, осот полевой, молокан татарский, выонок полевой, молочай лозный, клоповник крупковидный, пырей ползучий, острец, овсяног.

60. К ядовитым сорням относятся: триходесма седая, гелиотроп волосистоплодный, чемерица белая, болиголов пятнистый, белена черная, лютик ползучий, лютик едкий, лютик ядовитый, жеруха лекарственная.

61. При превышении максимально допустимых норм поражения болезнями сортовых посевов (посадок), установленных в таблице 4 сортовой посев (посадка) признается непригодным для использования на семенные цели.

Максимально допустимые нормы поражения болезнями сортовых посевов (посадок)

Название сельскохозяйственного растения 1	Название болезней 2	Степень пораженности болезнями, %, не более		
		категория семян		
		ОС, ЭС 3	РС 4	РСт 5
Анис обыкновенный	бактериоз		25%	
Арбуз	угловатая пятнистость	5%	10%	10%
Арахис	болезни увядания, желтуха, серая, мокрая гниль бобов		не нормируется	
	южная склероциальная гниль бобов		не допускается	
Базилик эвгенольный	Фузариоз		0,1%	
Баклажан	сухая гниль плодов	ЭС – 5%	10%	10%
Горох сахарных и лущильных сортов	аскохитоз	ЭС – 15%	25%	25%
	бактериоз	ЭС – 10%	20%	20%
Гречиха	фузариоз, вирусный ожог, серая гниль		в совокупности заболеваний – 30%	
Дыня	угловатая пятнистость	ЭС – 5%	10%	10%
Капуста	сосудистый бактериоз	не допускается	10%	10%
	альтернариоз	ЭС – 10%	30%	30%
	фомоз (сухая гниль)	ЭС – 10%	15%	15%
Картофель	вирусные болезни (симптомы проявления тяжелых форм мозаики (YВK) и вирус скручивания листьев картофеля (ВСЛК))	ОС – 0,4%, ЭС – 1%; для материала <i>in vitro</i> и мини-клубней – не допускается	2%	2%
Клещевина	фузариозное увядание, серая и белая гниль	0,2%	0,5%	
Конопля	заразиха	не допускается	–	–
Кориандр	рамуляриоз		3%	
	фузариоз		5%	
	бактериоз		25%	
Кукуруза	белъ, фузариоз,	не более 300 штук	не более 500 штук пораженных зерновок на	

Название сельскохозяйственного растения	Название болезней	Степень пораженности болезнями, %, не более		
		категория семян		
		ОС, ЭС	РС	РСт
1	2	3	4	5
	нитроспороз, красная и серая гниль	пораженных зерновок на 100 початков	100 початков	
Кунжут	болезни увядания	не нормируется		
Лаванда	септориоз, корневая гниль	не допускается	-	-
Лен-долгунец	фузариоз, полиспороз, аскохитоз, антракноз, пасмо (септориоз)	в совокупности заболеваний – 30%		
Люпин белый, желтый, узколистный	антракноз	не допускается	-	-
Морковь	альтернариоз	10%	10%	10%
	фомоз (сухая гниль)	5%	10%	10%
	бурая пятнистость листьев	10%		
	бактериоз	ЭС – 10%	15%	15%
Мята	вирусное израстание	не допускается		
Овес	головня пыльная и покрытая (в сумме)	не допускается	РС1 – не допускается; РС2 – 0,1%; РС последующих репродукций – 0,3%	0,5%
Отурец	угловатая пятнистость	ОС – 5%	10%	10%
Подсолнечник	сухая и серая гниль, склеротиниоз, ложная мучнистая роса, заразиха	не нормируется		
Просо	головня обыкновенная	не допускается	РС1 – 0%; РС2 и РС последующих репродукций – 0,3%	0,5%
Пшеница и полба	стеблевая головня	не допускается		
	пыльная головня	не допускается	РС1 – 0; РС2 и последующих репродукций – 0,1%	0,5%
	головня	не допускается	РС1 – 0;	0,3%

Название сельскохозяйственного растения	Название болезней	Степень пораженности болезнями, %, не более		
		категория семян		
		ОС, ЭС	РС	РСт
1	2	3	4	5
Рис	твердая головня	не допускается	не нормируется	РС2 и последующих репродукций – 0,1%
	рисовый афеленх	не допускается	не нормируется	
Рожь	головня твердая и стеблевая (в сумме)	не допускается	РС1 – 0; РС2 и последующих репродукций – 0,3%	0,5%
Свекла сахарная	Пероноспороз	пораженных растений – 2,5 %	пораженных растений – 5%	
	мозаика, ржавчина, ризоктониоз, вирусная желтуха, фузариоз			
Свекла (столовая, листовая, кормовая)	пероноспороз	поражение пероноспорозом: растений первого года жизни – 5%; растений второго года жизни – 2,5%		
	ржавчина, ризоктониоз, вирусная желтуха, корневые гнили		–	
Свекла столовая	ложная мучнистая роса	ЭС – 5%	15%	
	туберкулез	ЭС – 5%	15%	
	фомоз	ЭС – 5%	10%	
Сорго	пыльная головня	не допускается	РС1 – 0; РС2 и последующие репродукции – 0,3%	0,5%
Соя	фузариоз, аскохитоз, белая гниль		не нормируется	
Томат	бактериальный рак	ЭС – 5%	10%	
	черная бактериальная пятнистость	ЭС – 10%	15%	
	вирусные болезни	ЭС – 5%	10%	
Тмин	мучнистая роса		не допускается	
Тритикале	стеблевая головня		не допускается	
	пыльная, твердая головня (в сумме)	не допускается	РС1 и РС2 – 0,1%;	0,5%

Название сельскохозяйственного растения	Название болезней	Степень пораженности болезнями, %, не более		
		категория семян		
		ОС, ЭС	РС	РСТ
1	2	3	4	5
			РС последующих репродукций – 0,3%	
Фасоль овощная	антракноз	ЭС – 15%	25%	
Фенхель	церкоспороз		не допускается	
Хлопчатник	вертициллезный вилт		на растениях – не более 5%;	
	гоммоз		на растениях – не более 5%; на плодоэлементах – не допускается	
	фузариозный вилт		не допускается	
Шалфей мускатный	корневая гниль, фузариоз, мучнистая роса		не допускается	
Ячмень	пыльная головня	не допускается	РС1 и РС2 – 0,1%; РС последующих репродукций – 0,3%	0,5%
	твёрдая головня	не допускается	РС1 и РС2 – 0,1%; РС последующих репродукций – 0,3%	0,5%

62. Участки гибридизации сортовых посевов (посадок) должны быть оценены с учетом соблюдения предписанной схемы и сроков посева родительских компонентов и требуемого уровня мужской стерильности растений материнского компонента.

63. Наблюдения за опылением проводят на специальных пробных участках путем тщательного осмотра материнского и отцовского родительского компонента гибридного сорта.

64. Специальные пробные участки в количестве не менее 10 штук размещают равномерно в рядках материнского и отцовского

компонентов по наиболее длинной диагонали обследуемого сортового посева (посадки).

65. При проведении наблюдений за опылением учитывают только те растения материнского компонента, которые имеют рыльца пестика, способные к восприятию пыльцы, и (или) фертильные мужские цветки (соцветия) или пыльники.

В группу фертильной примеси в растениях стерильного материнского компонента относят только те растения, которые имеют фертильные мужские цветки (соцветия) или пыльники независимо от состояния рылец пестика.

66. У кукурузы и сорго в группу стерильных растений материнского компонента относят также те растения, которые выбросили рыльца пестика до начала цветения метелки при условии кастрации растений.

67. Растения, пригодные для обследования на специальном пробном участке, осматривают все подряд. Не допускается начинать обследование с фертильных растений материнского компонента или с растений, на которых удаление мужских цветков (соцветий) не проведено должным образом.

68. При первом наблюдении за опылением проводят точный учет цветущих растений материнского компонента: с рыльцами, готовыми к восприятию пыльцы, и (или) цветущими мужскими цветками (соцветиями) (стерильными или фертильными), и определяют их процентное содержание.

69. При обнаружении в посеве стерильного материнского компонента фертильных растений сверх норматива или некачественно удаленных мужских цветков (соцветий) аprobатор оформляет рекомендации о проведении мероприятий по сохранению и улучшению

сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений, где указывает выявленные недостатки, сроки и способы их устранения.

70. При проведении последующего наблюдения за опылением аprobатор проверяет фактическое выполнение рекомендаций о проведении мероприятий по сохранению и улучшению сортовых качеств семян, о чем делает пометку в журнале полевого обследования (приложение № 2 к настоящему документу).

71. Результаты обследований на каждом пробном и (или) специальном пробном участке заносятся в журнал полевого обследования (приложения № 1 и 2).

72. По результатам аprobации аprobатор устанавливает категорию и этап воспроизведения (размножения, репродукцию) семян сельскохозяйственных растений на основании представленных ему документов, содержащих сведения о сортовых качествах высеванных семян с учетом установленной в ходе аprobации сортовой чистоты сортового посева (посадки).

73. В случае несоответствия показателей сортовой чистоты требованиям законодательства государств-членов сортовые посевы (посадки) могут переводиться в соответствии с полученными результатами в более низкую категорию (этап воспроизведения, этап размножения, репродукцию) (например, оригинальные семена могут быть переведены в элитные, элитные – в первую репродукцию).

74. Результаты аprobации сортовых посевов (посадок) дополняются результатами проверок сортовых качеств высеванных семян, проводимых методом грунтового контроля (грунтовой оценки) семян (при наличии аprobируемого вида сельскохозяйственного растения в перечне сельскохозяйственных растений и категорий семян, в отношении которых оценка сортовых качеств семян методом

грунтового контроля (грунтовой оценки) является обязательной в соответствии законодательства государства-члена).

75. Сортовой посев (посадка) признается пригодным для использования на семенные цели только в случае, если сортовые качества семян (сортовая чистота или типичность) соответствуют требованиям, установленным законодательством государства-члена.

76. Сортовой посев однолетних и многолетних злаковых и бобовых трав и других сельскохозяйственных растений, семена которых высеваются узкорядным способом может быть признан пригодным на семенные цели если выявлены примеси:

для оригинальных (ОС) и элитных семян (ЭС) – не более 1 нетипичного заявленному сорту растения на 30 м² обследованного сортового посева (посадки),

для репродукционных семян – не более 1 нетипичного заявленному сорту растения на 10 м² обследованного сортового посева (посадки).

77. Сортовой посев сельскохозяйственных растений, семена которых высеваются широкорядным способом может быть признан пригодным на семенные цели если выявлены примеси:

для оригинальных (ОС) и элитных (ЭС) семян – не более 1 нетипичного заявленному сорту растения на 60 погонных метрах обследованного сортового посева (посадки);

для репродукционных (РС) семян – не более 1 нетипичного заявленному сорту растения на 20 погонных метрах обследованного сортового посева (посадки).

78. На участках гибридизации и участках родительских компонентов сортов-гибридов первого поколения не допускается

наличие растений мужского компонента в рядках материнского компонента.

В случае обнаружения растений мужского компонента в рядках сортового посева (посадки) материнского компонента аprobатор выдает заявителю рекомендации о проведении мероприятий по сохранению и улучшению сортовых качеств семян, в котором обязывает в срок до начала цветения растений мужского компонента организовать сплошное удаление таких растений в рядках материнского компонента.

79. Указанное требование не касается сортовых посевов ржи и других сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений в случае, если мужские и женские компоненты высеяны вместе в одном рядке согласно предписанной схеме производства семян.

80. В случае обнаружения факта невыполнения или неполного выполнения мероприятий по улучшению состояния сортовых посевов (посадок) согласно выданным заявителю рекомендациям сортовой посев (посадка) признается непригодным для использования на семенные цели.

81. При проведении (в случае необходимости) сравнительной оценки результатов апробации предельные расхождения результатов определения показателей сортовой чистоты и других показателей, в отношении которых установлены требования к сортовым качествам семян составляют:

при производстве оригинальных семян – 0,1%;

при производстве элитных семян – 0,2%;

при производстве репродукционных семян – 0,3%.

82. Для перекрестноопыляемых сельскохозяйственных растений (за исключением родительских компонентов сортов-гибридов

первого поколения и гибридов первого поколения) указанные предельные расхождения увеличиваются вдвое.

83. При выявлении на любом этапе аprobации несоответствия фактических показателей сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений установленным законодательством государств-членов требованиям, несоблюдения требований к пространственной изоляции посевов (посадок), требований к разделительной полосе или другим показателям, определяемым в ходе аprobации, учет остальных показателей может не производится.

V. Определение фактического показателя сортовой чистоты (сортовой типичности) сортовых посевов (посадок)

84. Значение сортовой чистоты, сортовой типичности обследованного сортового посева (посадки) рассчитывают по результатам обследования всех пробных участков и выражают как отношение числа растений (стеблей) аprobируемого сорта к общему числу растений (стеблей) вида, к которому относится сорт.

85. Для установления густоты стояния продуктивных растений или их стеблей на пробном участке растения или их стебли подсчитывают на одном погонном метре ряда (строки) каждого пробного участка или на $0,5 \text{ м}^2$ каждого пробного участка в случае, если посев семян сельскохозяйственных растений осуществлен сплошным способом или вразброс.

86. Густоту стояния продуктивных растений или стеблей на одном пробном участке 10 м^2 ($P_{\text{уч}}$) в штуках при рядовом посеве определяют по формуле:

$$P_{\text{уч}} = \frac{1000 \times M_{\text{пог}}}{III},$$

где:

$M_{\text{пог}}$ – количество продуктивных растений или стеблей апробируемого сельскохозяйственного растения на одном погонном метре рядка (строки) пробного участка (шт.);

Ш – ширина междуурядья (см).

87. Густоту стояния продуктивных растений или стеблей ($P_{\text{га}}$) в шт./га определяют при рядовом посеве по формуле:

$$P_{\text{га}} = \frac{1000000 \times \sum(M_{\text{пог}})/K_{\text{уч}}}{Ш},$$

где:

$\sum(M_{\text{пог}})$ – суммарное количество растений или стеблей на одном погонном метре рядка (строки) всех пробных участков (шт.);

$K_{\text{уч}}$ – количество всех пробных участков (шт.).

88. Для сельскохозяйственных растений, высеванных разбросным или сплошным посевом, $P_{\text{уч}}$ и $P_{\text{га}}$ вычисляется по формулам:

$$P_{\text{уч}} = 20 \times M_{\text{кв}},$$

$$P_{\text{га}} = 20000 \times \sum(M_{\text{кв}})/P_{\text{уч}},$$

где:

$M_{\text{кв}}$ – количество продуктивных растений или стеблей апробируемого сельскохозяйственного растения на $0,5 \text{ м}^2$ пробного участка, шт.

89. Если густота стояния растений или стеблей ($P_{\text{га}}$) больше 11 000 000 растений или стеблей, то соответствие сортовой чистоты семян сортового посева (посадки) требованиям к сортовой чистоте сельскохозяйственных растений определяют путем сравнения фактического показателя сортовой чистоты, рассчитанного как отношение количества типичных сорту растений (стеблей) к общему количеству обследованных растений (стеблей) на пробных участках, с установленным показателем сортовой чистоты (в процентах).

90. В случае, если количество растений на обследуемой площади сортового посева (посадки) меньше, чем необходимо для определения сортовой чистоты с учетом требований для заявленной категории семян, то для признания сортового посева (посадки) пригодным на семенные цели количество растений, типичных заявленному сорту, должно составлять 100 %.

91. В остальных случаях, когда густота стояния растений или стеблей (P_{ra}) составляет более 200 000 и менее 11 000 000, оценку соответствия сортовой чистоты семян сортового посева (посадки) установленным требованиям осуществляют по таблицам приложений № 6 и 7 к настоящему документу.

В приложениях № 6 и 7 указано максимальное количество продуктивных растений или стеблей растений, относящихся к отличающимся по аprobационным признакам от стеблей заявленного к аprobации сорта сельскохозяйственного растения (далее – сортовая примесь).

Для установления показателя сортовой чистоты необходимо выбрать строку, в которой указано значение, максимально приближенное к фактической (рассчитанной) густоте стояния продуктивных растений (стеблей). В выбранной строке в соответствующем нормируемому показателю сортовой чистоты столбце будет указано суммарное количество максимально допустимых сортовых примесей. Если указанное в таблице значение меньше или равно сумме фактически выявленных сортовых примесей, то сортовая чистота сортового посева (посадки) соответствует нормируемому показателю. В случае превышения табличного значения категория семян может быть установлена в соответствии с фактическим

содержанием сортовых примесей, не превышающим табличное значение для нормируемого показателя сортовой чистоты.

Если количество обследованных пробных участков площадью 10 м² больше 10, то для пользования таблицей требуется рассчитать ожидаемое количество сортовых примесей на 10 пробных участках площадью по 10 м² методом пропорции. Например, если на 12 пробных участках количество сортовых примесей составило 64 растения, то ожидаемое количество сортовых примесей (СП) на 10 пробных участках составит:

$$\text{ОСП} = \frac{\text{КСП} * 10}{\text{КПУ}} = \frac{64 * 10}{12} = 53 \text{ растения},$$

где:

ОСП – ожидаемое количество сортовых примесей на 10 пробных участках площадью по 10 м² каждый;

КСП – количество сортовых примесей (растений) на пробных участках, число которых превышает 10 и площадь каждого из которых составляет по 10 м² каждый;

КПУ – количество пробных участков.

Пример I.

Рассчитанная густота стояния продуктивных стеблей овса составляет 1 425 558 шт./га, что максимально соответствует строке 1 500 000 в столбце «Густота стояния стеблей на площади (Рга)» приложения № 6. При заявленной категории урожая семян – «элитные семена (ЭС)», для которой требуемый показатель сортовой чистоты составляет не менее 99,7%, предельно допустимое количество сортовых примесей составит 66 штук. Если фактическая сумма нетипичных сортов растений при обследовании 10 пробных участков по 10 м² составит 56 растений (то есть не превышает 66 штук), установленный показатель

сортовой чистоты составит не менее 99,7%, что соответствует требуемому показателю сортовой чистоты для заявленной категории семян «элитные семена (ЭС)».

Пример 2.

Рассчитанная густота стояния продуктивных стеблей ячменя составляет 2 106 013 шт/га, что соответствует строке 2 100 000 в столбце «Густота стояния стеблей на площади (Рга)» приложения № 6. При проведении окончательного обследования сортового посева на заявленную категорию семян – «элитные семена» обнаружено на 10 пробных участках площадью по 10 м² всего 95 штук нетипичных аprobируемому сорту продуктивных стеблей.

При заявленной категории урожая семян – «элитные семена» показатель сортовой чистоты для которой составляет не менее 99,7%, максимально допустимое количество нетипичных продуктивных стеблей должно быть не более 87 штук. По данному показателю посев не соответствует категории «элитные семена». Учитывая, что количество сортовых примесей не превышает значение 110 штук стеблей, показатель сортовой чистоты сортового посева устанавливается как не менее 99,6%, что допускается для семян ячменя категории «репродукционные семена (РС)», для которой предусматривается показатель не менее 98,0%. Таким образом, обследуемый сортовой посев (посадка) может быть признан пригодным на семенные цели с установленной категорией репродукционных семян – «первая репродукция».

92. Соответствия сортовой чистоты семян сортового посева (посадки) установленным требованиям при площади посева менее 100 м² или при густоте стояния растений или стеблей менее 200 000 определяют по таблицам 5 и 6.

Таблица 5

Оценка соответствия сортовой чистоты семян
при густоте стояния стеблей (P_{ra}) менее 200 000
(используется при обследовании продуктивных стеблей)

Количество стеблей, шт.	Показатели сортовой чистоты сельскохозяйственных растений, %, не менее																
	99,9	99,8	99,7	99,6	99,5	99,3	99,2	99,0	98,9	98,0	97,2	97,0	96,8	96,0	95,0	90,0	
максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при требуемом показателе сортовой чистоты сельскохозяйственных растений																	
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	19
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	13	14	16	19	32	
400	-	-	-	-	-	-	-	10	11	16	21	22	23	27	32	57	
500	-	-	-	-	-	-	10	12	13	19	25	26	27	33	39	69	
600	-	-	-	-	-	11	12	13	14	22	28	30	32	38	45	80	
800	-	-	-	-	10	13	14	16	18	27	36	38	40	48	57	103	
1000	-	-	-	10	12	15	16	19	21	33	43	45	48	57	69	126	
1400	-	-	11	13	15	19	21	25	27	43	57	60	63	76	93	171	
2000	-	10	13	16	19	25	28	33	35	58	77	81	86	104	127	237	
4000	10	16	22	28	33	43	48	58	63	105	141	150	159	194	238	451	
8000	16	28	38	48	58	77	86	105	114	194	264	282	299	368	453	872	

93. При требованиях к сортовой чистоте, отличающихся от требований, указанных в таблицах 5 и 6 настоящего документа, расчет максимально допустимого количества сортовых примесей ведут согласно расчету биноминального распределения вероятностей Бернулли для фактически выявленной густоты стояния растений и требуемого значения сортовой чистоты при $\alpha=0,05$. Это позволяет с высоким уровнем достоверности (95,0%) избежать риска ошибочного установления непригодности сортового посева (посадки) на семенные цели. Например, для показателя сортовой чистоты 99,9 %, когда предел неоднородности посева составляет 1 растение сортовой примеси на 1000 обследованных растений, риск ошибочного установления пригодности сортового посева (посадки) на семенные цели при выявлении 8 растений сортовых примесей на 4 000 обследованных составляет

менее 5% ($\alpha < 0,05$). При обследовании большего числа растений, чем требуется по правилу 4n, риск принятия ошибочного решения уменьшается, при уменьшении числа обследованных растений, наоборот, увеличивается.

Таблица 6

Оценка соответствия сортовой чистоты семян
при густоте стояния растений (P_{ra}) менее 200 000
(используется при обследовании продуктивных растений)

Количество растений, шт.	Показатели сортовой чистоты сельскохозяйственных растений, %, не менее																	
	99,9	99,8	99,7	99,6	99,5	99,3	99,2	99,0	98,9	98,5	98,0	97,2	97,0	96,8	96,0	95,0	90,0	
максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при требуемом показателе сортовой чистоты сельскохозяйственных растений																		
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	15	
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	10	11	13	15	27
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	13	14	15	18	21	39
400	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	10	13	17	18	19	23	27	50
500	-	-	-	-	-	-	-	8	9	10	12	15	20	22	23	27	33	61
600	-	-	-	-	-	-	8	9	10	11	14	18	24	25	27	32	39	72
800	-	-	-	-	-	8	10	11	13	14	18	23	30	32	34	41	50	94
1000	-	-	-	8	9	12	13	15	17	22	28	37	39	41	50	62	116	
1400	-	-	8	10	12	15	17	20	22	29	37	50	53	56	68	84	159	
2000	-	8	10	13	15	20	23	28	30	39	51	68	73	77	95	116	222	
4000	8	13	18	23	28	37	42	51	55	73	95	129	138	147	181	223	431	
8000	13	23	32	42	51	69	77	95	104	138	181	249	265	282	349	432	844	

94. Засоренность посева трудноотделимыми сельскохозяйственными растениями (Б), в %, определяют по формуле:

$$B = \frac{b}{P_{yu} + b} \times 100,$$

где:

б – количество продуктивных растений или стеблей, относящихся к трудноотделимым сельскохозяйственным растениям, шт.

95. Засоренность посева трудноотделимыми сорными растениями (В), в %, определяют по формуле:

$$B = \frac{v}{P_{yч} + v} \times 100,$$

где:

v – количество растений или стеблей трудноотделимых сорных, шт.

96. Пораженность сортового посева (посадки) болезнями (Γ), в %, определяют по формуле:

$$\Gamma = \frac{\Gamma}{P_{yч}} \times 100,$$

где:

Γ – количество растений или стеблей апробируемого сельскохозяйственного растения, пораженных болезнями, шт.

97. Поврежденность (заселенность) сортового посева вредителями (D), в %, определяют по формуле:

$$D = \frac{d}{P_{yч}} \times 100,$$

где:

d – количество растений или стеблей апробируемого сельскохозяйственного растения, поврежденных (заселенных) вредителями, шт.

VI. Оформление документов

98. Оформление акта аprobации (полевой инспекции) осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня завершения проведения аprobации сортовых посевов (посадок).

99. Акт аprobации (полевой инспекции) заполняется с использованием электронных печатающих устройств на русском языке и на государственном языке государства-члена (если это предусмотрено законодательством государства-члена).

100. Регистрационный номер акта аprobации (полевой инспекции) формируется в следующем порядке:

XX. XX. XXXX... – год оформления.

1	2	3	4
---	---	---	---

где:

позиция 1 – 2-значный буквенный код государства-члена в соответствии с классификатором стран мира;

позиция 2 – 2-значный цифровой код региона (области) государства-члена (от 01 до 99), формируемый в соответствии с законодательством государства-члена;

позиция 3 – регистрационный номер акта аprobации (полевой инспекции), формируемый в соответствии с законодательством государства-члена с использованием цифр от 01 до п...;

позиция 4 – год оформления акта аprobации (полевой инспекции).

Например:

RU. 32. 0123... – 2019

101. В случае, когда акт аprobации (полевой инспекции) составляется в 3 экземплярах, один из них передается заявителю, второй – аprobатору, третий – в организацию государства-члена, осуществляющую в соответствии с законодательством государства-члена деятельность по оказанию услуг на проведение полевой аprobации (полевой инспекции) сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений. В случае, когда акт аprobации (полевой инспекции) оформляется в 2 экземплярах (если аprobатор является представителем организации государства-члена, осуществляющей в соответствии с законодательством государства-члена деятельность по оказанию услуг на проведение полевой аprobации (полевой инспекции) сортовых посевов (посадок)

сельскохозяйственных растений) один из них передается заявителю, второй хранится у аprobатора и (или) в организации, осуществляющей в соответствии с законодательством государства-члена деятельность по оказанию услуг на проведение полевой аprobации (полевой инспекции) сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений.

102. Тарные этикетки, результаты грунтового контроля (грунтовой оценки) хранятся у заявителя, журналы полевого обследования и акты аprobации – у аprobатора.

103. Сроки хранения журналов полевого обследования, тарных этикеток, актов аprobации (полевой инспекции) составляют:

для оригинальных (ОС) и элитных семян (ЭС) – 6 лет;

для репродукционных семян (РС, РСт) – 3 года;

для семян родительских форм гибридных сортов (гибридов) – 6 лет.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к методу полевой апробации сортовых
посевов (посадок)
сельскохозяйственных растений

ЖУРНАЛ ПОЛЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений, за исключением
сортовых посевов (посадок) гибридов первого поколения

Регистрационный номер
сортового посева (посадки)

Дата начала
полевой апробации

1. Сведения о заявителе:

1.1. полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)
физическому лица:

1.2. адрес юридического лица, регистрации по месту жительства (месту пребывания)
физического лица:

1.3. номер телефона, адрес электронной
почты:

2. Сведения о лице, проводившем полевую апробацию:

2.1. фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, место работы:

2.2. номер телефона, адрес электронной
почты:

3. Сведения о семенах, использованных для посева (посадки) и о посеве (посадке):

3.1. название рода, вида, наименование сорта сельскохозяйственного растения:

3.2. категория, этап воспроизводства (репродукция) высейных семян:

3.3. номер партии высейных семян:

3.4. номер и дата выдачи документа о качестве высеванных семян:

3.5. происхождение высеванных семян:

3.6. количество высеванных семян (единиц):

3.7. площадь, место расположения и номер поля, участка посева (посадки):

3.8. дата посева (посадки):

3.9. сельскохозяйственные растения, предшествующие посеву (посадке):

3.10. метод определения сортовой чистоты или сортовой типичности сельскохозяйственного растения:

<input checked="" type="checkbox"/>	обследование посева	<input type="checkbox"/>	грунтовой контроль (грунтовая оценка)	<input type="checkbox"/>	лабораторный сортовой контроль
-------------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

3.11. Проведено прочисток (видовых, сортовых), шт.

4. Результаты предварительного обследования посева (посадки):

4.1. наличие разделительной полосы между посевами (посадками):

<input type="checkbox"/>	имеется	<input type="checkbox"/>	отсутствует	<input type="checkbox"/>	не требуется
--------------------------	---------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------

4.2. выполнение рекомендаций о сохранении и улучшении сортовых качеств сельскохозяйственных растений:

<input type="checkbox"/>	выполнены	<input type="checkbox"/>	выполнены частично	<input type="checkbox"/>	не выполнены
			соответствует		не соответствует

4.3. пространственная изоляция:

<input type="checkbox"/>	имеется	<input type="checkbox"/>	отсутствует	<input type="checkbox"/>	не требуется
--------------------------	---------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------

4.4. схема осмотра сортового посева (посадки) (номер схемы согласно Приложению № 4 к методу полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений)

<input type="checkbox"/>	имеется	<input type="checkbox"/>	отсутствует

4.5. фаза развития апробируемого сельскохозяйственного растения

<input type="checkbox"/>	имеется	<input type="checkbox"/>	отсутствует

4.6. заключение о пригодности посева (посадки) для окончательного обследования

<input type="checkbox"/>	пригоден	<input type="checkbox"/>	непригоден

5. Результаты окончательного обследования посева (посадки)

5.1. Количество выделенных пробных участков: шт.

- 5.2. Фактически выявленные показатели сортовых качеств семян сельскохозяйственного растения при подсчете на пробных участках:

Даты проведения обследований:

№ пробного участка	Оцениваемые нормируемые показатели, количество (шт.):					
	продуктивных растений или стеблей заявленного сельскохозяйственного растения	сортовых примесей с указанием наиболее отличимого признака	с признаками болезней	продуктивных растений или стеблей других сельскохозяйственных растений	сорных растений (с указанием наименования сорного растения)	
на 1 п.м. или 0,5 кв.м.			всего	трудноотделимых	всего	
1						
2						

6. Дополнительная информация по результатам обследования посева (посадки):

7. Особые замечания по обследованному посеву (посадке) в связи с видом апробируемого сельскохозяйственного растения:

Дата окончания полевой аprobации

Апробатор:

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к методу полевой апробации
сортовых посевов (посадок)
сельскохозяйственных растений

ЖУРНАЛ ПОЛЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ сортовых посевов (посадок) гибридов первого поколения

Регистрационный номер
сортового посева (посадки)

Дата начала полевой
апробации

1. Сведения о заявителе сельскохозяйственного растения:

1.1. полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица:

1.2. адрес юридического лица, регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица:

1.3. номер телефона, адрес электронной почты:

2. Сведения о лице, проводившем полевую апробацию:

2.1. фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, место работы:

2.2. номер телефона, адрес электронной почты:

3. Сведения о семенах сельскохозяйственного растения и его посеве (посадке):

3.1. название рода, вида, наименование сорта сельскохозяйственного растения:

3.2. категория, этап воспроизводства (репродукция) высейных семян:

3.3. номер партии высейных семян:

3.4. номер и дата выдачи документа о качестве высейных семян сельскохозяйственного растения:

3.5. происхождение семян сельскохозяйственного растения:

3.6. количество высеванных семян сельскохозяйственного растения (единиц):

3.7. площадь, место расположения и номер поля, участка посева (посадки):

3.8. дата посева (посадки):

3.9. сельскохозяйственные растения, предшествующие посеву (посадке):

3.10. метод определения сортовой чистоты или сортовой типичности сельскохозяйственного растения:

<input checked="" type="checkbox"/>	обследование посева	грунтовой контроль (грунтовая оценка)	лабораторный сортовой контроль
-------------------------------------	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------

4. Результаты предварительного обследования сортового посева (посадки) сельскохозяйственного растения

4.1. наличие разделительной полосы между посевами (посадками):

имеется _____ м.	отсутствует	не требуется
---------------------	-------------	--------------

4.2. выполнение рекомендаций о сохранении и улучшении сортовых качеств сельскохозяйственных растений:

выполнены	выполнены частично	не выполнены	не выдавались
4.3. пространственная изоляция:	соответствует _____ м	не соответствует	не нормируется

4.4. схема осмотра сортового посева (посадки) (номер схемы согласно Приложению № 4 к методу полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений)

4.5. фаза развития апробируемого растения

4.6. заключение о пригодности посева (посадки) для окончательного обследования

пригоден	непригоден
----------	------------

5. Результаты окончательного обследования посева (посадки) сельскохозяйственного растения

5.1. Количество выделенных пробных участков:

шт.

- 5.2. Фактически выявленные показатели сортовых качеств семян сельскохозяйственного растения при подсчете на пробных участках:

Даты проведения обследований: _____

№ пробного участка	Оцениваемые нормируемые показатели, количество (шт.):						
	продуктивных растений или стеблей заявленного сельскохозяйственного растения		продуктивных растений или стеблей других сельскохозяйственных растений		сортных растений (с указанием наименования сорного растения)		
	на 1 п.м. или 0,5 кв.м.	сортовых примесей с указанием наиболее отличимого признака	с признаками болезней	всего	трудноотделимых	всего	трудноотделимых
1							
2							

- 5.3. Результаты наблюдений за качеством удаления мужских цветков (соцветий) или полнотой стерильности на специальных пробных участках воспроизводства семян кукурузы сортов-гибридов первого поколения:

20__ г. 20__ г.

20__ г.

№ специального пробного участка	Оцениваемые показатели, количество (шт.):		
	Первое наблюдение: всего растений на участке: ___, в том числе	Второе наблюдение: всего растений на участке: ___, в том числе	Третье наблюдение Всего растений на участке: ___, в том числе
с цветущими женскими и(или) мужскими соцветиями / полностью или частично фертильных (для стерильного компонента) или с не удаленными или некачественно удаленными мужскими соцветиями (для фертильного компонента)			
	с цветущими метелками*: с цветущими метелками:	с цветущими метелками:	с цветущими метелками:
	с цветущими початками: с фертильными метелками:	с цветущими початками: с фертильными метелками:	с цветущими початками: с фертильными метелками:

6. Дополнительная информация по результатам обследования посева (посадки) при наблюдении за опылением:

7. Особые замечания по обследованному посеву (посадке), в соответствии с видом аprobируемого сельскохозяйственного растения:

Дата окончания полевой
апробации

Апробатор:

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

* Наименования соцветий необходимо указывать в соответствии с видом сельскохозяйственного растения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к методу полевой апробации
сортовых посевов (посадок)
сельскохозяйственных растений

АКТ АПРОБАЦИИ (ПОЛЕВОЙ ИНСПЕКЦИИ)

№ _____ от « ____ » 20 ____ года

Заявитель

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

подавшего заявку на проведение полевой аprobации

Аprobатор

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, место работы)

В присутствии заявителя, оригиналатора (автора) сорта или их представителей

(наименование заявителя, оригиналатора (автора) сорта, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя)

произведена полевая аprobация сортовых посевов посадок

(наименование и регистрационный

номер сорта, указанный в национальном реестре единого реестра сортов сельскохозяйственных растений,

наименование рода и вида сельскохозяйственного растения, категории (стадия воспроизводства (размножения))

сорта, репродукции высоких семян)

находящихся на полях

(наименование заявителя: страна, край, область, район, населенный пункт)

для получения семян:

(оригинальных, элитных, репродукционных)

Полевая аprobация проведена в соответствии с методом

(наименование метода,

номер и дата принятия нормативного правового акта, устанавливающего метод полевой аprobации)

При полевой аprobации установлено:

1.

Наименование сорта	Ботаническая разновидность	Количество растений на 1 га	Сортовая чистота (%)

2. Патентообладатель

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

3.

Дата посева (посадки)	Место посева (посадки) (севооборот, № поля)	Дата обследования посева (предварительного и окончательного)	Площадь, га

4. Посев произведен семенами

(номер и дата документа на высевные семена, категория (репродукция,

тип воспроизводства (размножения) сорта), сортовая чистота высевных семян)

5. Результаты грунтового контроля (грунтовой оценки) (для сортовых посевов оригинальных и элитных семян, урожай с которых предназначен для реализации) (%)

6. Результаты лабораторного сортового контроля (при наличии) (%)

7. В случае если семена приобретены, указать, когда и от кого получены семена, номер неисключительного и исключительного договора, срок действия договора

8. В чем заключается семеноводческая работа с сортом

(посев на высоком агрономическом и сортовом уровне и др.)

9. Соблюдена ли пространственная изоляция

10. Имеются ли в хозяйстве посевы (посадки) других сортов данного сельскохозяйственного растения, их наименование и площадь посева

11. Предшественники посева (посадки):

12. Фаза развития апробируемого сельскохозяйственного растения в момент апробации

13. Засоренность посева сорными растениями (наименование, количество)

14. Применение гербицидов (название, норма расхода)

15. Ожидаемый урожай с гектара (оценка), ц

16. Анализ:
а) пробных участков

Основного сорта						Состав сортовой засоренности					
Основного сорта			в т.ч. растений, стеблей, отклонившихся от основного типа, сорта			Название и количество растений, стеблей			всего		
									кол-во	%	
									кол-во	%	
название и количество растений	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	кол-во	%	
название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	кол-во	%	
название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	название и количество	кол-во	%	
Примесь трудноотделенных сельскохозяйственных растений	Засоренность трудноотделимыми сорняками растениями	Засоренность злостными, наиболее вредными сорняками	Засоренность болезнями и пораженностью вредителями сельскохозяйственных растений								
название и количество	название и количество	название и количество	название и количество								
всего	всего	всего	всего								
кол-во	%	кол-во	%								

б) початков кукурузы основного типа _____ шт., _____ %, початков кукурузы других типов _____ шт. _____ %, ксерийных зерен на 100 початков кукурузы основного типа _____ шт. зерен	С заключением согласен
и) типичность для перекрестноопыляемых	Заявитель
в) типичность для перекрестноопыляемых	(подпись)
17. Заключение:	Гарантийное обязательство:
Заявитель _____	(наименование юридического лица, фамилия, инициалы, отчество (при наличии))
18. Особые замечания и предложение (при наличии отклоняющихся типов в апобиорусом сорте обязательно указываются признаки, по которым они отклоняются):	Физического типа)
Ф.И.О. агробиогора	подпись
Ф.И.О.	подпись
полпись	20 г.
М.П.	« »
20 г.	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методу апробации сортовых
посевов (посадок)
сельскохозяйственных растений

СХЕМЫ осмотра сортового посева (посадки) во время предварительного обследования и для размещения пробных участков

Распределение пробных участков для проведения сортовой или видовой идентификации, или идентификации типичности гибридов осуществляется в произвольном порядке в соответствии с принципом максимально широкой репрезентативности.


Количество пробных участков составляет 10 и более участков.

Апробатор визуально разделяет поле на соответствующее количество зон и случайно выбирает пробный участок в каждой зоне, как для предварительного, так и для окончательного обследования сортового посева (посадки).

При проведении апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений используются схемы осмотра сортового посева (посадки), основанные на обследовании прямоугольного поля площадью 50 га.

Направление движения апробатора в схемах обозначено стрелками.


Схема № 1



Обследование поля по схеме № 1 позволяет аprobатору осмотреть $\frac{7}{8}$ площади сортового посева (посадки). В целях обеспечения достоверности обследования по схеме № 1 аprobатору необходимо периодически отклоняться от траектории движения к краю поля для оценки соблюдения требований к пространственной изоляции.

Схема № 1 может применяться при проведении аprobации сортовых посевов (посадок) всех сельскохозяйственных растений и рекомендуется при проведении аprobации сортовых посевов (посадок), предназначенных для получения оригинальных и элитных семян.


Схема № 2



Обследование поля по схеме № 2 идентично обследованию по схеме № 1, но позволяет осмотреть 1/2 площади сортового посева (посадки).

Применение схемы № 2 рекомендуется при проведении апробации сортовых посевов (посадок), предназначенных для получения элитных и репродукционных семян.


Схема № 3



Обследование поля по схеме № 3 позволяет практически полностью осмотреть сортовой посев (посадку), при этом центральная зона поля осматривается дважды.

Схема № 3 рекомендуется при апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений, выращиваемых на небольших площадях, когда пространственная изоляция может быть оценена при нахождении апробатора в любом из углов поля, а выявление сортовых примесей является наиболее важной частью апробации, например, при осмотре сортовых посевов (посадок), предназначенных для получения оригинальных семян.

Схема № 4



Обследование поля по схеме № 4 применяется в случае, если оценка пространственной изоляции является приоритетной при проведении предварительного обследования сортового посева (посадки).

Применение схемы № 4 позволяет осмотреть растения на 100% площади сортового посева (посадки). Применение схемы № 4 рекомендуется для обследования малых площадей, а также в случаях, когда на сортовом посеве (посадке) выявлено наличие значительного количества примесей (особенно примесей, влияющих на показатели сортовой чистоты сельскохозяйственных растений), в том числе выявленных в ходе предварительного обследования сортовых посевов (посадок).

Схема № 5




Схема обследования сортового посева (посадки) № 5 является наиболее применимой для полей с правильной прямоугольной формой и для всех категорий семян. В некоторых случаях аprobатору требуется дополнительное посещение центральной части сортового посева (посадки), например, если результаты осмотра с расстояния вызывают сомнения.

Схема № 6




Схема обследования сортового посева (посадки) № 6 предусматривается при совместной одновременной работе двух аprobаторов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к методу полевой апробации
сортовых посевов (посадок)
сельскохозяйственных растений

РЕКОМЕНДАЦИИ
апробатора о проведении мероприятий по сохранению
и улучшению сортовых качеств семян

« ____ » 20 ____ г.

(место составления)

Мною, аprobатором, _____ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) аprobатора)

в отношении Заявителя _____ (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество

(при наличии) физического лица, юридический адрес (место жительства))
в присутствии

(наименование заявителя (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество

(при наличии) физического лица; юридический адрес (место жительства)) или представителя заявителя))

проведено обследование сортового посева (посадки):

(название сельскохозяйственного растения, наименование сорта, категория (этап воспроизводства,

репродукция семян) номер и местонахождение поля (посева, (посадки)), площадь посева (посадки)

при проведении полевой аprobации установлено:

Рекомендовано:

Аprobатор _____ « ____ » 20 ____ г.
(Ф.И.О.) (подпись) дата

Копию рекомендаций получил:
_____ « ____ » 20 ____ г.
(должность (при наличии), (Ф.И.О.) (подпись) дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К методу полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений

Определение соответствия сортовой чистоты апробируемого сортового посева (посадки) установленным требованиям при густоте стояния стеблей от 200 000 до 11 000 000 (используется при подсчете продуктивных стеблей)

Густота стояния стеблей на площади (Pra)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)									
	6,66	8,66	10,66	9,66	5,66	3,66	2,66	0,66	0,86	0,72
Максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при обследовании 10 пробных участков площадью по 10 м²										
200 000	7	10	14	17	20	25	28	33	36	60
300 000	9	14	18	22	27	35	38	46	50	82
400 000	10	17	23	28	33	44	48	60	63	105
500 000	12	20	27	33	40	52	58	70	76	128
600 000	15	23	30	38	45	61	68	84	89	153
700 000	16	25	35	44	52	69	78	94	102	173
800 000	17	28	38	49	58	78	87	105	115	195
900 000	18	31	42	53	66	86	96	117	127	218
1 000 000	20	33	46	58	70	94	106	128	140	239
1 100 000	21	36	50	63	76	102	115	140	152	261

Густота стеблей на площади (Pra)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)									
	6,66	8,66	10,66	9,66	5,66	7,66	0,66	6,86	0,86	2,66
Максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при обследовании 10 пробных участков площадью по 10 м ²										0,06
1 200 000	24	38	54	68	84	110	124	151	164	283
1 300 000	25	41	57	73	88	118	133	162	177	305
1 400 000	26	44	63	78	94	126	142	173	189	327
1 500 000	27	46	66	82	99	134	151	185	201	348
1 600 000	28	49	68	87	106	142	160	196	213	370
1 700 000	29	51	72	92	111	150	169	207	225	391
1 800 000	30	54	75	96	117	158	178	218	237	413
1 900 000	32	56	79	101	123	166	187	229	250	434
2 000 000	33	58	83	106	128	173	196	240	262	455
2 100 000	36	61	87	110	135	181	205	251	274	477
2 200 000	37	63	89	115	140	189	213	262	286	498
2 300 000	38	66	93	119	145	197	222	273	298	519
2 400 000	39	68	96	124	153	205	231	283	309	541
2 500 000	40	70	100	128	157	212	240	294	321	562
2 600 000	41	73	104	133	162	220	249	305	333	583
2 700 000	42	75	108	138	168	228	257	316	345	604
2 800 000	43	78	110	142	173	235	266	327	357	625
2 900 000	44	80	114	147	179	243	275	338	369	647

Густота стояния стеблей на площади (Pra)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)									
	6,66	8,66	10,66	9,66	12,66	10,66	6,86	0,86	7,6	0,76
Максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при исследовании 10 пробных участков площадью по 10 м²										0,06
3 000 000	45	82	117	151	186	251	283	348	381	668
3 100 000	47	85	121	156	190	258	292	359	393	949
3 200 000	49	87	125	160	196	266	301	370	404	1 045
3 300 000	51	89	129	165	201	274	310	381	416	1 112
3 400 000	52	92	132	169	207	281	318	391	428	1 145
3 500 000	53	94	134	174	212	289	327	402	440	1 176
3 600 000	54	96	138	178	219	297	335	413	451	1 199
3 700 000	55	99	141	182	223	304	344	424	463	1 232
3 800 000	56	101	144	187	229	312	353	434	475	1 264
3 900 000	57	103	150	191	234	319	361	445	487	1 295
4 000 000	58	106	151	196	240	327	370	456	499	1 337
4 100 000	60	108	155	200	245	335	379	467	510	1 378
4 200 000	61	110	158	205	251	342	387	477	522	1 411
4 300 000	62	113	161	209	256	350	396	488	534	1 451
4 400 000	63	115	165	214	262	357	405	499	545	1 494
4 500 000	65	117	168	218	267	365	413	509	557	1 544
4 600 000	66	119	171	222	273	372	422	520	569	1 597
4 700 000	67	122	175	227	278	380	430	531	580	1 646

Густота стояния стеблей на площади (Pra)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)									
	6,66	8,66	7,66	9,66	5,66	7,66	0,66	6,86	0,86	7,66
Максимально допустимое количество сорточных примесей (шт.) при исследовании 10 пробных участков										площадью по 10 м ²
4 800 000	68	124	178	231	284	387	439	541	592	1 046
4 900 000	69	126	181	236	289	395	447	552	604	1 067
5 000 000	71	129	185	240	295	403	456	562	615	1 087
5 100 000	72	131	188	244	300	410	465	573	627	1 108
5 200 000	73	133	191	249	305	418	473	584	639	1 129
5 300 000	74	135	195	253	311	425	482	594	650	1 150
5 400 000	75	138	198	258	316	433	490	605	662	1 171
5 500 000	77	140	201	262	322	440	499	615	674	1 192
5 600 000	78	142	205	266	327	447	507	626	685	1 212
5 700 000	79	144	208	271	333	455	516	637	697	1 233
5 800 000	80	147	211	275	338	462	524	647	708	1 254
5 900 000	81	149	215	279	343	470	533	658	720	1 275
6 000 000	82	151	218	284	349	477	541	668	732	1 296
6 100 000	84	154	221	288	354	485	550	679	743	1 316
6 200 000	85	156	225	292	360	492	558	689	755	1 337
6 300 000	86	158	228	297	365	500	567	700	766	1 358
6 400 000	87	160	231	301	370	507	575	711	778	1 379
6 500 000	88	162	235	305	376	515	584	721	789	1 400

Густота стеблей на площади (Pra)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)															
	6,66	8,66	9,66	5,66	7,66	0,66	6,86	0,86	7,6	0,76	8,96	0,96	9,56	0,06		
Максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при обследовании 10 пробных участков										площадью по 10 м ²						
6 600 000	89	165	238	310	381	522	592	732	801	1 420	1 966	2 102	2 238	2 780	3 455	6 814
6 700 000	91	167	241	314	386	530	601	742	813	1 441	1 995	2 133	2 271	2 821	3 507	6 915
6 800 000	92	169	244	318	392	537	609	753	824	1 462	2 024	2 164	2 304	2 862	3 558	7 017
6 900 000	93	171	248	323	397	544	618	763	836	1 483	2 053	2 195	2 337	2 903	3 609	7 118
7 000 000	94	174	251	327	403	552	626	774	847	1 503	2 081	2 226	2 369	2 944	3 660	7 220
7 100 000	95	176	254	331	408	559	635	784	859	1 524	2 110	2 256	2 402	2 985	3 711	7 321
7 200 000	96	178	258	336	413	567	643	795	870	1 545	2 139	2 287	2 435	3 026	3 762	7 423
7 300 000	98	180	261	340	419	574	651	805	882	1 565	2 168	2 318	2 468	3 067	3 813	7 524
7 400 000	99	183	264	344	424	582	660	816	893	1 586	2 197	2 349	2 501	3 108	3 865	7 626
7 500 000	100	185	267	349	429	589	668	826	905	1 607	2 226	2 380	2 534	3 149	3 916	7 728
7 600 000	101	187	271	353	435	596	677	837	916	1 628	2 255	2 411	2 567	3 190	3 967	7 829
7 700 000	102	189	274	357	440	604	685	847	928	1 648	2 283	2 442	2 600	3 231	4 018	7 931
7 800 000	103	191	277	362	445	611	694	858	939	1 669	2 312	2 472	2 633	3 272	4 069	8 032
7 900 000	105	194	280	366	451	619	702	868	951	1 690	2 341	2 503	2 666	3 313	4 120	8 134
8 000 000	106	196	284	370	456	626	711	879	962	1 710	2 370	2 534	2 698	3 354	4 171	8 235
8 100 000	107	198	287	375	461	634	719	889	974	1 731	2 399	2 565	2 731	3 395	4 222	8 336
8 200 000	108	200	290	379	467	641	727	900	985	1 752	2 427	2 596	2 764	3 436	4 273	8 438
8 300 000	109	203	294	383	472	648	736	910	997	1 772	2 456	2 627	2 797	3 477	4 324	8 539

Густота стояния стеблей на площади (Рга)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)															
	6,66	8,66	10,66	9,66	5,66	2,66	0,66	6,86	0,86	2,76	0,76	8,96	0,96	9,56	0,06	
Максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при обследовании 10 пробных участков площадью по 10 м ²																
8 400 000	110	205	297	388	477	556	744	921	1 008	1 793	2 485	2 657	2 830	3 518	4 375	8 641
8 500 000	111	207	300	392	483	663	753	931	1 020	1 814	2 514	2 688	2 863	3 559	4 426	8 742
8 600 000	113	209	303	396	488	671	761	942	1 031	1 834	2 543	2 719	2 895	3 600	4 477	8 844
8 700 000	114	211	307	400	493	678	770	952	1 043	1 855	2 571	2 750	2 928	3 640	4 528	8 945
8 800 000	115	214	310	405	499	685	778	962	1 054	1 876	2 600	2 781	2 961	3 681	4 579	9 046
8 900 000	116	216	313	409	504	693	786	973	1 066	1 896	2 629	2 811	2 994	3 722	4 630	9 148
9 000 000	117	218	316	413	509	700	795	983	1 077	1 917	2 658	2 842	3 027	3 763	4 681	9 249
9 100 000	118	220	320	418	515	707	803	994	1 089	1 938	2 686	2 873	3 060	3 804	4 732	9 351
9 200 000	120	222	322	422	520	715	812	1 004	1 100	1 958	2 715	2 904	3 092	3 845	4 783	9 452
9 300 000	121	225	326	426	525	722	820	1 015	1 112	1 979	2 744	2 935	3 125	3 886	4 834	9 553
9 400 000	122	227	329	430	531	730	828	1 025	1 123	1 999	2 773	2 965	3 158	3 927	4 885	9 655
9 500 000	123	229	333	435	536	737	837	1 036	1 135	2 020	2 801	2 996	3 191	3 968	4 936	9 756
9 600 000	124	231	336	439	541	744	845	1 046	1 146	2 041	2 830	3 027	3 223	4 009	4 987	9 857
9 700 000	125	233	339	443	547	752	854	1 057	1 158	2 061	2 859	3 058	3 256	4 049	5 038	9 959
9 800 000	126	236	342	448	552	759	862	1 067	1 169	2 082	2 888	3 088	3 289	4 090	5 089	10 060
9 900 000	128	238	346	452	557	766	870	1 077	1 181	2 103	2 916	3 119	3 322	4 131	5 140	10 161
10 000 000	129	240	349	456	563	774	879	1 088	1 192	2 123	2 945	3 150	3 355	4 172	5 191	10 263
10 100 000	130	242	352	460	568	781	887	1 098	1 204	2 144	2 974	3 181	3 387	4 213	5 242	10 364

Густота стояния стеблей на площади (Рга)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)																	
	6,66	8,66	10,66	9,66	5,66	7,66	0,66	6,86	0,86	97,0	97,2	97,6	97,8	97,96	98,96	99,96	99,99	
Максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при обследовании 10 пробных участков площадью по 10 м ²																		
10 200 000	131	244	355	465	573	789	896	1 109	1 215	2 164	3 002	3 211	3 420	4 254	5 293	10 465		
10 300 000	132	247	358	469	579	796	904	1 119	1 226	2 185	3 031	3 242	3 453	4 295	5 344	10 567		
10 400 000	133	249	362	473	584	803	912	1 130	1 238	2 206	3 060	3 273	3 486	4 335	5 395	10 668		
10 500 000	134	251	365	478	589	811	921	1 140	1 249	2 226	3 089	3 304	3 518	4 376	5 446	10 769		
10 600 000	135	253	368	482	594	818	929	1 150	1 261	2 247	3 117	3 334	3 551	4 417	5 497	10 870		
10 700 000	137	255	371	486	600	825	937	1 161	1 272	2 267	3 146	3 365	3 584	4 458	5 548	10 972		
10 800 000	138	258	375	490	605	833	946	1 171	1 284	2 288	3 175	3 396	3 617	4 499	5 599	11 073		
10 900 000	139	260	378	495	610	840	954	1 182	1 295	2 309	3 203	3 426	3 649	4 539	5 650	11 174		
11 000 000	140	262	381	499	616	847	963	1 192	1 307	2 329	3 232	3 457	3 682	4 580	5 700	11 275		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к методу полевой апробации
сортовых посевов (посадок)
сельскохозяйственных растений

**Определение соответствия сортовой чистоты априориумого сортового посева (посадки)
установленным требованиям при густоте стояния растений от 200 000 до 11 000 000
(используется при подсчете продуктивных растений)**

Густота стояния растений (Ртн.)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)										0,06
	6,66	7,66	8,66	9,66	10,66	11,66	12,66	13,66	14,66	15,66	
200 000	5	8	10	13	15	20	23	28	30	51	68
300 000	6	10	14	18	22	29	32	39	43	73	99
400 000	8	13	18	23	28	37	42	51	55	95	129
500 000	9	15	22	28	33	45	51	62	67	117	159
600 000	10	18	25	32	39	53	60	73	80	138	189
700 000	12	20	29	37	45	61	69	84	92	160	219
800 000	13	23	32	42	51	69	77	95	104	181	249
900 000	14	25	36	46	56	76	86	106	116	202	278
1 000 000	15	28	39	51	62	84	95	117	127	223	307
1 100 000	17	30	43	55	67	92	104	127	139	244	337

Максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при обследовании 10 пробных участков площадью по 10 м²

Густота стояния растений (Pra)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)									
	6,66	7,66	8,66	9,66	5,66	6,66	7,66	8,66	6,86	7,86
Максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при обследовании 10 пробных участков площадью по 10 м ²										
1 200 000	18	32	46	60	73	99	112	138	151	265
1 300 000	19	35	50	64	78	107	121	149	163	287
1 400 000	20	37	53	69	84	114	130	160	175	308
1 500 000	22	39	56	73	89	122	138	170	186	328
1 600 000	23	42	60	77	95	130	147	181	198	349
1 700 000	24	44	63	82	100	137	155	192	210	370
1 800 000	25	46	66	86	106	145	164	202	221	391
1 900 000	26	48	70	91	111	152	172	213	233	412
2 000 000	28	51	73	95	117	160	181	223	245	433
2 100 000	29	53	76	99	122	167	190	234	256	454
2 200 000	30	55	80	104	127	175	198	245	268	474
2 300 000	31	57	83	108	133	182	206	255	279	495
2 400 000	32	60	86	112	138	190	215	266	291	516
2 500 000	33	62	89	117	144	197	223	276	302	537
2 600 000	35	64	93	121	149	204	232	287	314	557
2 700 000	36	66	96	125	154	212	240	297	325	578
2 800 000	37	69	99	130	160	219	249	308	337	599
2 900 000	38	71	103	134	165	227	257	318	348	619

Густота стояния растений (Pra)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)									
	6,66	8,66	7,66	9,66	5,66	3,66	2,66	0,66	0,86	0,96
Максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при обследовании 10 пробных участков площадью по 10 м ²										
3 000 000	39	73	106	138	170	234	266	329	360	640
3 100 000	40	75	109	143	176	241	274	339	371	661
3 200 000	42	77	112	147	181	249	282	350	383	681
3 300 000	43	80	116	151	186	256	291	360	394	702
3 400 000	44	82	119	155	192	264	299	370	406	723
3 500 000	45	84	122	160	197	271	308	381	417	743
3 600 000	46	86	125	164	202	278	316	391	429	764
3 700 000	47	88	129	168	208	286	324	402	440	785
3 800 000	48	91	132	173	213	293	333	412	452	805
3 900 000	50	93	135	177	218	300	341	423	463	826
4 000 000	51	95	138	181	223	308	350	433	475	846
4 100 000	52	97	141	185	229	315	358	443	486	867
4 200 000	53	99	145	190	234	322	366	454	497	887
4 300 000	54	102	148	194	239	330	375	464	509	908
4 400 000	55	104	151	198	245	337	383	475	520	929
4 500 000	56	106	154	202	250	344	391	485	532	949
4 600 000	57	108	158	207	255	352	400	495	543	970
4 700 000	59	110	161	211	260	359	408	506	554	990

Густота стояния растений (Рта)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)									
	6,66	8,66	7,66	9,66	5,66	3,66	2,66	0,66	8,86	9,96
Максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при обследовании 10 пробных участков площадью по 10 м ²										
4 800 000	60	112	164	215	266	366	416	516	566	1 011
4 900 000	61	115	167	219	271	374	425	527	577	1 031
5 000 000	62	117	170	223	276	381	433	537	589	1 052
5 100 000	63	119	174	228	281	388	441	547	600	1 072
5 200 000	64	121	177	232	287	396	450	558	611	1 093
5 300 000	65	123	180	236	292	403	458	568	623	1 113
5 400 000	66	125	183	240	297	410	466	578	634	1 134
5 500 000	67	128	186	245	302	417	475	589	646	1 154
5 600 000	69	130	190	249	308	425	483	599	657	1 175
5 700 000	70	132	193	253	313	432	491	609	668	1 195
5 800 000	71	134	196	257	318	439	500	620	680	1 216
5 900 000	72	136	199	261	323	447	508	630	691	1 236
6 000 000	73	138	202	266	329	454	516	640	702	1 257
6 100 000	74	140	205	270	334	461	524	651	714	1 277
6 200 000	75	143	209	274	339	468	533	661	725	1 298
6 300 000	76	145	212	278	344	476	541	671	736	1 318
6 400 000	77	147	215	283	350	483	549	682	748	1 339
6 500 000	79	149	218	287	355	490	558	692	759	1 359

Густота стояния растений (Pra)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)									
	6,66	7,66	8,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
Максимально допустимое количество сортовых примесей (шт.) при исследовании 10 пробных участков площадью по 10 м^2										
6 600 000	80	151	221	291	360	498	566	702	770	1 379
6 700 000	81	153	225	295	365	505	574	713	782	1 400
6 800 000	82	155	228	299	371	512	582	723	793	1 420
6 900 000	83	158	231	304	376	519	591	733	804	1 441
7 000 000	84	160	234	308	381	527	599	744	816	1 461
7 100 000	85	162	237	312	386	534	607	754	827	1 482
7 200 000	86	164	240	316	391	541	616	764	838	1 502
7 300 000	87	166	244	320	397	548	624	774	850	1 522
7 400 000	88	168	247	325	402	556	632	785	861	1 543
7 500 000	90	170	250	329	407	563	640	795	872	1 563
7 600 000	91	173	253	333	412	570	649	805	884	1 584
7 700 000	92	175	256	337	417	577	657	816	895	1 604
7 800 000	93	177	259	341	423	585	665	826	906	1 625
7 900 000	94	179	263	345	428	592	673	836	917	1 645
8 000 000	95	181	266	350	433	599	682	847	929	1 665
8 100 000	96	183	269	354	438	606	690	857	940	1 686
8 200 000	97	185	272	358	443	614	698	867	951	1 706
8 300 000	98	187	275	362	449	621	706	877	963	1 727

Густота стояния растений (Pra)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)									
	6,66	7,66	8,66	9,66	9,5	9,3	9,2	9,0	8,86	8,76
Максимально допустимое количество сортоных примесей (шт.) при обследовании 10 прибрежных участков площадью по 10 м ²										0,96
8 400 000	99	190	278	366	454	628	715	888	974	1 747
8 500 000	100	192	282	371	459	635	723	898	985	1 767
8 600 000	102	194	285	375	464	642	731	908	997	1 788
8 700 000	103	196	288	379	469	650	739	919	1 008	1 808
8 800 000	104	198	291	383	475	657	748	929	1 019	1 829
8 900 000	105	200	294	387	480	664	756	939	1 030	1 849
9 000 000	106	202	297	391	485	671	764	949	1 042	1 869
9 100 000	107	204	300	396	490	679	772	960	1 053	1 890
9 200 000	108	207	304	400	495	686	781	970	1 064	1 910
9 300 000	109	209	307	404	501	693	789	980	1 076	1 930
9 400 000	110	211	310	408	506	700	797	990	1 087	1 951
9 500 000	111	213	313	412	511	708	805	1 001	1 098	1 971
9 600 000	112	215	316	416	516	715	814	1 011	1 109	1 992
9 700 000	113	217	319	421	521	722	822	1 021	1 121	2 012
9 800 000	115	219	322	425	527	729	830	1 032	1 132	2 032
9 900 000	116	221	326	429	532	736	838	1 042	1 143	2 053
10 000 000	117	224	329	433	537	744	847	1 052	1 155	2 073
10 100 000	118	226	332	437	542	751	855	1 062	1 166	2 093

Густота стояния растений (Ртн)	Требуемый показатель сортовой чистоты сельскохозяйственных растений (не менее, %)									
	6,66	8,66	10,66	9,66	5,66	3,66	2,66	0,66	0,86	0,96
Максимально допустимое количество сортировых примесей (шт.) при обследовании 10 пробных участков площадью по 10 м^2										
10 200 000	119	228	335	441	547	758	863	1 073	1 177	2 114
10 300 000	120	230	338	446	553	765	871	1 083	1 188	2 134
10 400 000	121	232	341	450	558	773	880	1 093	1 200	2 155
10 500 000	122	234	344	454	563	780	888	1 103	1 211	2 175
10 600 000	123	236	348	458	568	787	896	1 114	1 222	2 195
10 700 000	124	238	351	462	573	794	904	1 124	1 233	2 216
10 800 000	125	240	354	466	578	801	912	1 134	1 245	2 236
10 900 000	126	243	357	471	584	809	921	1 144	1 256	2 256
11 000 000	128	245	360	475	589	816	929	1 155	1 267	2 277

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 30 января 2020 г. № 10

**МЕТОД
грунтового контроля
сельскохозяйственных растений**

I. Общие положения

1. Настоящий документ разработан в соответствии с подпунктом 13 пункта 7 статьи 95 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьей 5 Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза от 7 ноября 2017 года (далее – Соглашение) на основе Рекомендаций по испытанию на контрольных участках и полевой апробации сортовых посевов сельскохозяйственных культур Организации экономического сотрудничества и развития (2012) и устанавливает единые требования при определении в государствах – членах Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) принадлежности сельскохозяйственных растений к определенному сорту и сортовой чистоты партий семян сельскохозяйственных растений на различных этапах семеноводства методом грунтового контроля сельскохозяйственных растений (далее – грунтовой контроль).

2. Настоящий документ применяется при проведении грунтового контроля зерновых, зернобобовых, крупяных, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, овощных, бахчевых, лекарственных культур и картофеля.

3. В зависимости от того, на каком этапе семеноводства сельскохозяйственных растений проводится грунтовой контроль, используются понятия – предконтроль и постконтроль.

Участки для проведения предконтроля закладываются одновременно с посевами сельскохозяйственных растений, предназначенными на семенные цели и подлежащими апробации.

Предконтроль проводится для получения объективной информации о подлинности сорта и сортовых качествах семян до момента принятия окончательного решения о пригодности сортовых посевов сельскохозяйственных растений на семенные цели по результатам полевой апробации.

Постконтроль проводится в отношении партий семян после их реализации или высева. Постконтроль позволяет оценить эффективность системы семеноводства на основе данных о чистоте сорта в процессе его воспроизводства.

При проведении грунтового контроля в отношении партий семян, предназначенных для дальнейшего размножения, с одного и того же участка грунтового контроля можно получить результаты постконтроля для высеванных партий семян и, одновременно, результаты предконтроля для партий семян, предназначенных для посева в следующем сезоне.

4. Перечень сельскохозяйственных растений и категорий семян, в отношении которых оценка сортовых качеств семян методом грунтового контроля обязательна, определяется согласно требованиям законодательства государства-члена, на территорию которого ввозятся семена.

II. Основные понятия

5. Для целей настоящего документа используются понятия, которые означают следующее:

«грунтовой контроль (грунтовая оценка) сельскохозяйственных растений» – установление принадлежности сельскохозяйственных растений к определенному сорту и определение сортовой чистоты и типичности сельскохозяйственных растений посредством посева (посадки) семян на участках грунтового контроля;

«заявитель» – юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на проведение грунтового контроля (грунтовой оценки) сельскохозяйственных растений в организацию государства-члена, осуществляющую в соответствии с законодательством государства-члена деятельность по оказанию услуг на проведение грунтового контроля (грунтовой оценки) сельскохозяйственных растений;

«контрольная проба» – количество семян соответствующего сорта сельскохозяйственного растения, отобранное от партии семян и предназначенное для определения сортовой чистоты или сортовой типичности сельскохозяйственных растений при проведении грунтового контроля;

«оригинальные семена (ОС) (дабазовые семена)» – семена сельскохозяйственных растений, произведенные оригиналатором сорта сельскохозяйственных растений или уполномоченным им лицом в порядке, установленном законодательством государства-члена;

«официальное описание сорта» – документ (перечень сведений), содержащий описание существенных признаков сорта сельскохозяйственного растения, определяемых организацией государства-члена, осуществляющей в соответствии с законодательством государства-члена испытание сортов

сельскохозяйственных растений по критериям отличимости, однородности и стабильности сорта сельскохозяйственного растения;

«партия семян» – определенное количество семян одного сорта сельскохозяйственного растения, однородных по происхождению, сортовым и посевным (посадочным) качествам, одного года урожая;

«репродукционные семена (РС) (сертифицированные семена)» – семена сортов сельскохозяйственных растений, полученные от последовательного размножения элитных семян (первое и последующие поколения, число которых определяется в соответствии с законодательством государства-члена);

«репродукционные семена для производства товарной продукции (РСт)» – семена сортов сельскохозяйственных растений, полученные от последовательного размножения репродукционных семян и предназначенные исключительно для производства товарной продукции;

«сортовая типичность» – показатель сортовой чистоты перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных растений;

«сортовая чистота» – отношение числа растений (стеблей) основного сорта сельскохозяйственного растения к общему количеству обследованных развитых растений (стеблей) на участках грунтового контроля данного сельскохозяйственного растения, выраженное в процентах;

«стандартный образец» – количество семян сорта сельскохозяйственного растения, которое передается заявителем сорта в организацию государства-члена, осуществляющую в соответствии с законодательством государства-члена испытание сортов сельскохозяйственных растений по критериям отличимости, однородности и стабильности сорта сельскохозяйственного растения

после включения сорта в национальный реестр, и хранящееся в указанной организации;

«стандартная проба» – проба семян сорта сельскохозяйственного растения, взятая от стандартного образца для проведения грунтового контроля;

«существенные признаки» – признаки сельскохозяйственных растений, позволяющие определить характерные и отличительные особенности сорта сельскохозяйственных растения при проведении грунтового контроля, во всех случаях поддающиеся точному описанию;

«элитные семена (ЭС) (базовые семена)» – семена, полученные от последовательного размножения оригинальных семян согласно схемам их производства, устанавливаемым в соответствии с законодательством государства-члена.

Иные понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных Соглашением и актами органов Союза, принятыми в его реализацию.

III. Общие требования при проведении грунтового контроля

1. Требования к контрольным пробам

6. Для проведения грунтового контроля от партии семян сельскохозяйственных растений отбираются две контрольные пробы (за исключением картофеля, где отбирается одна проба), одна из которых используется для проведения грунтового контроля, а вторая (дубликат), используемая при возникновении споров, хранится не менее одного года в организации государства-члена, осуществляющей в соответствии с законодательством государства-члена деятельность по оказанию услуг по проведению грунтового контроля (далее – уполномоченная организация государства-члена).

7. Отбор и оформление контрольных проб осуществляется организацией или лицом, имеющими в соответствии с законодательством государства-члена право на отбор проб семян сельскохозяйственных растений, согласно требованиям, установленным межгосударственными стандартами, определенными перечнем единых методов определения посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений, применяемых государствами – членами Евразийского экономического союза при обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 40.

8. Контрольные пробы должны сопровождаться актом отбора средних проб и документом, содержащим сведения о сортовых и посевных качествах партии семян сельскохозяйственных растений, от которой они были отобраны.

9. Контрольные пробы для грунтового контроля предоставляются заявителем в уполномоченную организацию государства-члена не менее чем за один месяц до срока посева (посадки) соответствующего сельскохозяйственного растения. Контрольные пробы предоставляются в непротравленном виде.

10. Масса контрольной пробы по видам сельскохозяйственных растений зависит от нормы высеива, способа посева и количества закладываемых повторностей, и должна быть не менее установленной в таблице 1.

Таблица 1

**Минимальная масса контрольной пробы семян
сельскохозяйственных растений для проведения грунтового контроля**

Сельскохозяйственные растения	Минимальная масса семян (кг)
Арбуз, тыква, кабачок, патиссон	0,5
Баклажан, перец	0,02
Бобы	1,0
Брюква	0,1
Горох, фасоль	1,0
Зерновые (кроме кукурузы и сорго)	1,0
Кукуруза	1,0
Капуста (в т.ч. кольраби)	0,03
Картофель	120 клубней
Лен-долгунец, лен масличный	0,5
Лук чернушка	0,05
Морковь, петрушка, пастернак, шпинат, укроп, салат	0,05
Огурец, дыня	0,1
Однолетние и многолетние бобовые травы	0,5
Однолетние и многолетние злаковые травы	0,3
Подсолнечник	1,0
Рапс	0,1
Редис, редька	0,15
Репа, турнепс	0,05
Свекла сахарная	0,5
Свекла столовая	0,4
Сельдерей, салат	0,015
Сорго	0,25
Спаржа, ревень	0,1
Томат	0,02
Хлопчатник	1,0
Щавель	0,04

11. Каждая контрольная пробы семян должна сопровождаться внешней и внутренней этикетками, содержащими следующую информацию: название рода и вида сельскохозяйственного растения, наименование сорта, номер партии, категория (этап размножения) семян и количество семян.

12. Одна этикетка должна быть надежно прикреплена на поверхности каждой упаковки, а другая находится внутри упаковки.

13. При поступлении контрольных проб семян в уполномоченную организацию государства-члена проверяется целостность упаковки, наличие печатей, этикеток и сопроводительных документов.

14. Контрольные пробы, оформленные с нарушением положений, предусмотренных пунктами 6-13 раздела III настоящего документа, не принимаются и обезличиваются в порядке, установленном законодательством государства-члена.

15. Контрольные пробы, поступившие для грунтового контроля, регистрируются в порядке их поступления в журнале регистрации контрольных проб для проведения грунтового контроля (далее – журнал регистрации), форма которого приведена в приложении № 1 к настоящему документу. На мешочках с контрольными пробами проставляется регистрационный номер контрольной пробы согласно журналу регистрации контрольных проб для проведения грунтового контроля.

2. Общие требования при подготовке участка грунтового контроля

16. В соответствии с количеством поступивших на грунтовой контроль контрольных проб сельскохозяйственных растений согласно записи в журнале регистрации, уполномоченной организацией государства-члена составляется рабочий план по закладке проб грунтового контроля (далее – рабочий план), на котором указываются: название рода и вида сельскохозяйственного растения, наименование сорта, категория (этап размножения, репродукция), наименование производителя семян и номер контрольной пробы.

Номера контрольных проб в рабочем плане проставляются дробью: в числителе – полевой номер, в знаменателе – регистрационный номер контрольной пробы.

В посевной ведомости проставляются полевые номера контрольных проб.

Одновременно с составлением рабочего плана производится систематизация контрольных проб, на мешочеках с которыми над регистрационным номером проставляется полевой номер контрольной пробы.

17. Уполномоченная организация государства-члена определяет участок для проведения грунтового контроля.

На участке грунтового контроля требуется выполнение следующих мероприятий:

щательное изучение истории полей с подбором наиболее выровненных по плодородию участков;

соблюдение севооборота;

соблюдение норм пространственной изоляции;

использование специализированного оборудования и техники, применяемых при проведении испытания сортов сельскохозяйственных растений на отличимость, однородность и стабильность;

применение общепринятых для данной зоны агротехнологий;

применение удобрений, средств защиты растений в дозах, необходимых для формирования здоровых растений, но не влияющих на проявление существенных признаков;

исключение использования регуляторов роста;

осуществление загрузки семян в сеялку, очистка сеялки за пределами участка грунтового контроля;

обеспечение равных и оптимальных условий развития растений для определения существенных признаков;

утилизация оставшихся семян пробы сорта сельскохозяйственного растения после посева.

18. Размер участка грунтового контроля, схема посева, количество обследуемых сельскохозяйственных растений должны обеспечивать возможность достоверного выявления нетипичных сельскохозяйственных растений.

19. Делянки на участке грунтового контроля должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивалась доступность для проведения наблюдений.

20. Схема размещения контрольных делянок на участке грунтового контроля зависит от используемой сельскохозяйственной техники и испытываемых видов сельскохозяйственных растений и приведена на рисунке.

З	St	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	St	K			З
З																З
З																З
З																З
З																З
З	St	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	St	K			З
З																З

Обозначения: З – защитные делянки;

St – стандарт. Делянки, на которых высеваются семена стандартной пробы;

K – контрольные делянки, на которых высеваются семена контрольных проб от различных партий оригинальных, элитных и репродукционных семян.

21. Главным условием проведения грунтового контроля является обеспечение возможности сравнения растений, выращенных из семян

контрольной пробы, с растениями, полученными из семян стандартной пробы.

Делянки размещаются в порядке, при котором все контрольные пробы одного и того же сорта сгруппированы вместе. Морфологически похожие сорта объединяются в блоки и размещаются в непосредственной близости друг от друга с целью выявления незначительных различий между ними. В отношении одного и того же сорта сравнение существенных признаков упрощается при условии высева контрольных проб семян одного производителя на соседних делянках. В этом случае, при выявлении примеси на одной делянке, можно сразу же обследовать соседнюю делянку на их присутствие.

22. По усмотрению уполномоченной организации государства-члена контрольная делянка дублируется в другой части поля.

Рекомендуемые схемы посева на участках грунтового контроля приведены в таблице 2.

Таблица 2

Схемы посева сельскохозяйственных растений
на участке грунтового контроля

Культуры	Рекомендуемые параметры делянки			Минимальное количество обследуемых растений (шт.)
	количество рядков (шт.)	ширина между рядами (см)	расстояние в рядке (см)	
Арбуз, дыня, тыква, кабачок, патиссон	2	70-90	1-2	200
Баклажан, перец зашщищенный грунт открытый грунт	2	70	35	200
	2	60	40	200
Брюква, репа, турнепс, лук-семена	2	40	2-3	200
Горох, бобы овощные, фасоль	2	25-45	5-10	200
Зерновые (кроме кукурузы и сорго)	6-12	15-23	2-10	2000
Капуста				

Культуры	Рекомендуемые параметры делянки			Минимальное количество обследуемых растений (шт.)
	количество рядков (шт.)	ширина межурядья (см)	расстояние в рядке (см)	
ранняя	2	50	50	200
средняя	2	60	60	200
поздняя	2	70	70	200
Крупяные культуры (просо, гречиха)	6-12	15-23	2-10	1500
Кукуруза (кроме кукурузы сахарной)	2	70	30	200
Кукуруза сахарная	2	60	40	200
Лен масличный	6-12	15-23	1,0-1,5	1000
Лен-долгунец	6-12	15-23	0,4-0,7	1000
Лук-севок	2	55-60	10-15	200
Огурец				
зашщищенный грунт	2	140	20	200
открытый грунт	2	100	40	200
Однолетние и многолетние травы	2-4	30-40	2-3	300
Подсолнечник	2	70	30-40	200
Прочие корнеплоды	2	45	20	200
Рапс	6-12	30	2-5	1000
Редис, морковь	2	10-45	3-5	400
Свекла сахарная	2	45	16-20	200
Свекла столовая	2	45	5-8	300
Сорго	2	70	30-40	200
Томат				
зашщищенный грунт	2	80	40;60*	200
открытый грунт	2	40;80;100**	50; 40;50**	200
Хлопчатник	8-10	90	5-10	200
Шпинат, щавель, укроп, ревень	2	10	2	200

* Расстояние: 40 см – для среднеплодных сортов, 60 см – для крупноплодных сортов.

** Размер делянки в зависимости от группы сортов: 40x50 – карликовые, толстостебельные; 80x40 – среднестебельные; 100x50 – высокостебельные.

23. Посев семян овощных культур для получения рассады (таких как капуста, томат, перец, баклажан и другие) осуществляется в защищенном грунте (в зависимости от скороспелости сорта и зоны выращивания) в сроки, обеспечивающие вызревание растений до технической спелости.

24. Для некоторых видов кормовых трав и бобовых используют схемы одиночного размещения растений на контрольных делянках, чтобы обеспечить измерение морфологических признаков (например, длина листа, ширина листа, высота растения и др.).

25. Одновременно с контрольными делянками закладываются делянки стандарта. Стандарт на участке грунтового контроля размещают через каждые десять контрольных делянок.

26. Оставшиеся от посева контрольной пробы семена обезличиваются в порядке, установленном законодательством государства-члена.

3. Общие методические требования к проведению грунтового контроля

27. Во время проведения грунтового контроля проверяется наличие и степень проявления основных существенных признаков сортов сельскохозяйственных растений (в том числе с учетом особенностей отдельных видов сельскохозяйственных растений) согласно признаковой шкале методик проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность (далее – методика ООС) на основе методик Международного союза по охране новых сортов растений в сравнении с официальным описанием сортов сельскохозяйственных растений и (или) с признаками сельскохозяйственных растений, выращенных из стандартной пробы семян. Требования к оценке основных существенных признаков сортов сельскохозяйственных растений при проведении грунтового контроля определенного вида сельскохозяйственного растения соответствуют требованиям, прописанным в соответствующих методиках ООС.

28. Нетипичные растения помечаются лентой, этикеткой или иными возможными обозначениями.

29. Для сортов перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных растений, сортовая чистота не оценивается в абсолютных величинах. При определении количества примесей на контрольных делянках следует использовать требования по оценке однородности в соответствии с методиками ООС.

30. В случае установления несоответствия проявления существенных признаков сорта сельскохозяйственного растения (более допустимого количества сортовых примесей) на контрольных делянках с признаками официального описания сорта и (или) с проявлением существенных признаков сельскохозяйственных растений на делянках стандарта заявителю направляется извещение (форма извещения приведена в приложении № 2 к настоящему документу).

31. При проведении грунтового контроля в течение всего вегетационного периода проводятся фенологические наблюдения в посевах (посадках) по каждой контрольной пробе отдельно. Результаты фенологических наблюдений заносятся в полевой журнал (приложение № 3 к настоящему документу), в котором отмечаются: срок посева (посадки), дата появления всходов, время пикировки и высадки рассады (для культур, выращиваемых рассадным способом), время цветения и завязывания плодов, сроки начала и массового созревания плодов и другие фенологические фазы.

32. Результаты грунтового контроля оформляются документом «Результаты грунтового контроля» (форма приведена в приложении № 4 к настоящему документу), который составляется в двух экземплярах: один экземпляр направляется заявителю, второй экземпляр хранится в уполномоченной организации государства-члена.

33. Учет урожая при уборке не производится.

34. Заявитель или уполномоченное им лицо могут посещать участки грунтового контроля в сопровождении специалиста уполномоченной организации государства-члена при условии согласования с ней даты и цели посещения.

35. Если растения на делянках грунтового контроля поражены болезнями и не представляется возможным получить достоверные результаты, делянки выбраковываются с указанием причин и грунтовой контроль не проводится.

36. В случае гибели высеванного образца на участке грунтового контроля, а также выбраковки делянок заявитель немедленно ставится об этом в известность в письменном виде.

IV. Статистические расчеты при проведении грунтового контроля

1. Предельное количество нетипичных растений для различных размеров проб и стандартов сортовой чистоты

37. Для выбраковки партии семян достаточно знать предельное количество нетипичных растений на делянке, которое коррелирует с выборкой образца и площадью делянки.

В таблицах 3 и 4 приведено предельное количество нетипичных растений для различных размеров выборки и стандартов сортовой чистоты.

Предельное количество нетипичных растений могут считаться достоверными только при условии достаточного размера выборки. Образец считается несоответствующим стандарту сортовой чистоты и бракуется, если количество нетипичных растений равно или превышает пороговое значение для данной выборки.

Предельное количество нетипичных растений для различных размеров проб и стандартов сортовой чистоты

Количество растений (шт.)	Стандарт сортовой чистоты, %				
	99,9	99,7	99,5	99,0	98,0
	предельное количество нетипичных растений (шт.)				
200	-	-	4	6	9
300	-	-	5	7	11
400	-	4	6	9	14
1000	4	7	10	16	29
1400	5	9	13	21	38
2000	6	11	16	29	52
4000	9	19	28	52	96

Примечание: Символ (-) обозначает, что размер пробы слишком мал для проведения эффективного анализа соответствующей пробы.

Предельное количество нетипичных стеблей для различных размеров проб и стандартов сортовой чистоты

Количество стеблей (шт.)	Стандарт сортовой чистоты, %				
	99,9	99,7	99,5	99,0	98,0
	предельное количество нетипичных стеблей (шт.)				
200	-	-	5	7	11
300	-	-	6	9	14
400	-	5	7	11	17
1000	5	9	12	20	34
1400	6	11	16	26	44
2000	7	14	20	34	59
4000	11	23	34	59	106
8000	17	39	59	106	197

Примечание: Символ (-) обозначает, что размер пробы слишком мал для проведения эффективного анализа соответствующей пробы.

38. Для некоторых видов кормовых трав, когда густота стояния растений высокая, стандарты сортовой чистоты выражаются как число растений на единицу площади.

39. Для получения информации об уровне сортовой чистоты конкретного участка грунтового контроля рекомендуется провести

исследование на площади не менее 5 м². Для целей принятия окончательного решения относительно сортовой чистоты используются предельное количество нетипичных растений (таблица 5).

Таблица 5

Предельное количество нетипичных растений для участков различной площади и различных стандартов сортовой чистоты

Площадь, подвергшаяся исследованию (м ²)	Стандарт сортовой чистоты					
	1 / 50 м ²	1 / 30 м ²	1 / 20 м ²	1 / 10 м ²	4 / 10 м ²	6 / 10 м ²
	предельное количество нетипичных стеблей (шт.)					
5	2	2	2	3	6	7
10	2	2	3	4	9	11
15	2	3	3	5	11	15
20	3	3	4	6	14	19
25	3	4	4	6	16	23
30	3	4	5	7	19	26
35	3	4	5	8	21	30
40	3	4	6	9	24	33
45	4	5	6	9	26	37
50	4	5	6	10	29	40

2. Применение фактического стандарта сортовой чистоты

40. Для установления соответствия партии семян на участках грунтового контроля следует применить фактический стандарт сортовой чистоты на соответствующую выборку, указанный в таблицах 6-8.

41. Принимая во внимание относительно низкие стандарты сортовой чистоты, применяемые в отношении партий репродукционных семян гибридных сортов растений для целей постконтроля (97,0% для простых гибридов и 95,0% для других видов гибридов),

уполномоченная организация вправе принять решение о применении фактических стандартов сортовой чистоты для определения качества партии семян на участках грунтового контроля, указанных в таблицах 6-8.

Таблица 6

**Применение фактического стандарта сортовой чистоты 97,0%
(для простых гибридов)**

Размер выборки (количество растений)	удовлетворительный результат	неудовлетворительный результат	(штук)
100	3	4	
67-99	2	3	
33-66	1	2	
<33	0	1	

Таблица 7

**Применение фактического стандарта сортовой чистоты 95,0%
(для трехлинейных, простых модифицированных гибридов
и других типов гибридов)**

Размер выборки (количество растений)	удовлетворительный результат	неудовлетворительный результат	(штук)
100	5	6	
80-99	4	5	
60-79	3	4	
40-59	2	3	
20-39	1	2	
<20	0	1	

42. При производстве элитных семян кукурузы минимальная сортовая чистота составляет 99,5% (не более 1 нетипичного растения на 200 растений).

43. При производстве репродукционных семян минимальная сортовая чистота составляет 99,0% (не более 1 нетипичного растения на 100 растений).

44. При производстве элитных семян родительских компонентов для гибридных сортов кукурузы минимальная сортовая чистота составляет 99,9% (не более 1 нетипичного растения на 1000 растений).

45. При проведении постконтроля в отношении партий репродукционных семян гибридных сортов кукурузы, стандарт сортовой чистоты составляет: для простых гибридов – 97,0% (не более 1 нетипичного растения на 33 растения); для других типов гибридов – 95,0% (не более 1 нетипичного растения на 20 растений).

Таблица 8

Применение фактических стандартов сортовой чистоты
99%, 99,5% и 99,9%

Размер выборки (количество растений), шт.	Сортовая чистота — применение фактического стандарта					
	гибриды (ЭС)		перекрестно-опыляющиеся (ЭС)		перекрестно-опыляющиеся (РС)	
	99,9%		99,5%		99,0%	
	удовлетворительный результат	неудовлетворительный результат	удовлетворительный результат	неудовлетворительный результат	удовлетворительный результат	неудовлетворительный результат
предельное количество нетипичных стеблей (шт.)						
<1 000	0	1	—	—	—	—
200	0	1	1	2	2	3
100	0	1	0	1	1	2
75	0	1	0	1	0	1
50	0	1	0	1	0	1

3. Применение предельного количества нетипичных растений для различных размеров выборки

46. Предельное количество нетипичных растений, приведенные в таблицах 9-11, могут использоваться дополнительно к фактическому стандарту соответствия партии семян перекрестноопыляющихся сортов и гибридов установленным требованиям сортовой чистоты для различных размеров выборки. Как правило, чем больше количество

растений на участках грунтового контроля, тем точнее показатель количества нетипичных растений в оригинальной партии семян.

Таблица 9

Предельное количество нетипичных растений для различных размеров выборки и стандартов сортовой чистоты
99,9%, 99,5% и 99,0%

Размер выборки (количество растений), шт.	Сортовая чистота		
	гибриды (ЭС)	перекрестно- опыляющиеся (ЭС)	перекрестно- опыляющиеся (РС)
	99,9%	99,5%	99,0%
предельное количество нетипичных стеблей (шт.)			
100	—	3	4
200	—	4	6
300	—	5	7
400	—	6	8
500	3	7	10
600	3	7	11
700	3	8	13
800	3	9	14
900	4	9	15
1 000	4	10	16
1 100	4	11	18
1 200	4	11	19
1 300	4	12	20
1 400	5	13	21
1 500	5	13	23
1 600	5	14	24
1 700	5	15	25
1 800	5	15	26
1 900	5	16	27
2 000	6	16	29

Предельное количество нетипичных растений
для различных размеров выборки и стандарта сортовой чистоты 97,0%
(для простых гибридов)

Размер выборки (количество растений), шт.	Предельное количество нетипичных растений (штук)
47 – 66	5
67 – 88	6
89 – 110	7
111 – 134	8
135 – 158	9
159 – 182	10
183 – 207	11
208 – 232	12
233 – 258	13

Предельное количество нетипичных растений для различных размеров
выборки и стандарта сортовой чистоты 95,0% (для трехлинейных,
простых модифицированных гибридов и других типов гибридов)

Размер выборки (количество растений), шт.	Предельное количество нетипичных растений (штук)
41 – 53	6
54 – 67	7
68 – 81	8
82 – 95	9
96 – 110	10
111 – 125	11



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к методу грунтового контроля сельскохозяйственных растений

**ЖУРНАЛ
регистрации контрольных проб для проведения грунтового контроля**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к методу грунтового контроля
сельскохозяйственных растений

ИЗВЕЩЕНИЕ

сообщает,

(Наименование организации государства-члена, осуществляющей в соответствии с законодательством государства-члена деятельность по оказанию услуг по проведению грунтового контроля)

что при проведении грунтового контроля проб (ы), согласно заявке от _____ № _____ установлено несоответствие(я) проявления существенных признаков сельскохозяйственных растений (более допустимого количества сортовых примесей) по следующему(им) существенному(ым) признаку(ам):

Название сельскохозяйственного растения	Наименование сорта	Номер партии	Наименование существенного признака	Стандартная проба (официальное описание сорта)		Контрольная проба		
				степень выраженности признака	Индекс признака	степень выраженности признака	Индекс признака	количество сортовых примесей (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дополнительные сведения _____

Руководитель

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к методу грунтового контроля
сельскохозяйственных растений

**ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ
проведения грунтового контроля**

Участок грунтового контроля _____

Адрес: _____

Название сельскохозяйственного растения _____

Год проведения _____

Общие данные:

1. Почва

Тип			
Механический состав			
Высота стояния грунтовых вод			
Однородность почвы участка			
Агрехимические показатели почвы:	pH	гумус	
P ₂ O ₅	мг/100 г,	K ₂ O	мг/100г
Преобладающие сорняки			
Состояние всходов			
Другие факторы			

2. Схема делянки

Длина посевная, м	учетная, м	
Расстояние между растениями в рядке, см		
Ширина посевная, м	учетная, м	
Ширина междурядий, см		
Число рядков на делянке, шт.		для учета, шт.
Число растений на делянке, шт.		для учета, шт.

3. Эскиз проведения грунтового контроля

--

4. Посев, уборка

Дата посева
Способ посева
Тип сеялки
Глубина заделки семян, см
Дата обмолота
Способ обмолота

5. Удобрения

Действующее вещество		Наименование удобрения	Норма (кг/га)	Срок внесения	Способ внесения, глубина заделки (см)
вид	кг/га				
1	2	3	4	5	6

6. Обработка почвы и уход за посевами

№ п/п	Наименование работ, проведенных от уборки предшественника до окончания всех работ по проведению грунтового контроля	Дата выполнения	Наименование работ: машины, орудия обработки, пестициды и нормы внесения и т.д.
1	2	3	4

7. Фенологические наблюдения (даты)

7.1. Озимые зерновые сельскохозяйственные растения: пшеница, рожь, тритикале, ячмень

№ п/п	Регистрационный номер контрольной пробы	Посева	Входов		Начало кущения	Прекращение осенней вегетации	Начало весенней вегетации
			начало	полные			
1	2	3	4	5	6	7	8

Колошение		Полного цветения у ржи	Спелости			Уборки	Число дней от полных всходов до восковой спелости
начало	полное		молочной	восковой	полной		
9	10	11	12	13	14	15	16

7.2 Яровые зерновые сельскохозяйственные растения: пшеница, ячмень, тритикале, овес

№ п/п	Регистрационный номер контрольной пробы	Посева	Всходов		Начала кущения	Колошения или выметывания метелки	
			начало	полные		начало	полное
1	2	3	4	5	6	7	8

Цветения		Спелости			Уборки	Число дней от полных всходов до восковой спелости
начало	полное	молочная	восковой	полной		
9	10	11	12	13	14	15

7.3 Озимый и яровой рапс

№ п/п	Регистрационный номер контрольной пробы	Посева	Всходов		Образования розетки	Начала развития листьев весной
			начало	полные		
1	2	3	4	5	6	7

Начала стеблевания	Начала бутонизации	Начала цветения	Образование стручков	Спелости		Уборки	Число дней от полных всходов до полной спелости
				молочной	полной		
8	9	10	11	12	13	14	15

7.4. Лен-долгунец, лен масличный

№ п/п	Регистрационный номер контрольной пробы	Посева	Всходов	Начала развития 1-5 листа «фаза слочки»		Бутонизация	Появления соцветий на главном стебле
				начала	полного		
1	2	3	4	5	6	7	

Начала цветения	Развития семенных коробочек	Созревания		Уборки	Число дней от всходов до полного созревания
		начала	полного		
8	9	10	11	12	13

7.5. Иные сельскохозяйственные растения: _____

№ п/п	Регистрационный номер контрольной пробы	Посева	Всходов			
1	2	3	4	5	6	...п

8. Проведение определений и описаний

Наименование сорта _____

Количество обследуемых сельскохозяйственных растений _____ шт.

Номер пробы (партии)	Номер признака	Признак	Стандартная проба (официальное описание)			Контрольная проба		
			степень выраженности	индекс	дата учета	соответствие (+,-)	индекс	количество нетипичных растений, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9. Влияние климатических условий на ход вегетации, окончательная оценка и выводы по опыту _____

10. Дополнительная информация _____

11. Удостоверили данные

Выполнил в поле,

лаборатории

Составил полевой журнал

Проверил

Ответственный за проведение грунтового контроля

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации, проводящей грунтовой контроль

(подпись)

(Ф.И.О.)

Печать

« ____ » 20 г.
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методу грунтового контроля
сельскохозяйственных растений

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУНТОВОГО КОНТРОЛЯ № ____

от 20 г.

1. Сведения о заявителе

1.1. Полное наименование, адрес юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства физического лица _____

1.2. Номер телефона, факс, адрес электронной почты _____

2. Сведения о семенах сельскохозяйственного растения

2.1. Название сельскохозяйственного растения

2.2. Наименование сорта

2.3. Регистрационный номер контрольной пробы

2.4. Номер партии высеванных семян

2.5. Категория, этап размножения высеванных семян

2.6. Номер и дата акта отбора средних проб

3. Сортовая чистота или сортовая типичность партии семян сельскохозяйственных растений по итогам проведения грунтового контроля, % _____

(Отношение числа сельскохозяйственных растений/стеблей сельскохозяйственных растений (не нужно вычеркнуть) к общему числу сельскохозяйственных растений/стеблей сельскохозяйственных растений (не нужно вычеркнуть), к которому относится сорт заявленного сельскохозяйственного растения на обследуемом участке грунтового контроля)

Дополнительные сведения _____

Видовая примесь и др. (наименование и количество, шт.) _____

Руководитель организации,
проводящей грунтовой контроль

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)