

ДОПОЛНЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕЕСТРУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
И УДОБРЕНИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(14 марта 2025 г.)

<i>Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, заявитель</i>	<i>Норма расхода препа- рата (л, кг/га, л, кг/т)</i>	<i>Культура, обрабатывае- мые объекты</i>	<i>Вредный организм, назначение</i>	<i>Способ, время обработки, ограничения</i>	<i>Срок по- с- ледней обра- ботки (в днях до сбора уро- жая)</i>	<i>Крат- ность обра- боток</i>
НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ						
ИНСЕКТИЦИДЫ						
ВИРТЭНТО, СК (изоциклосерам, 400 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейца- рия (Р), (П-1)	0,15-0,3	Картофель	Личинки май- ского хруща	Обработка дна бо- розды при посадке картофеля. Расход рабочей жидкости 150 л/га	50	1
	0,1-0,15		Проволочники			
	0,15- 0,225	Яблоня	Яблонная пло- дo- жорка	Опрыскивание в пе- риод вегетации	15	2
	0,05-0,1		Яблонный цве- тоед	То же		
	0,1-0,15		Плодовые клещи, яблон- ный плодовой пилильщик	То же		
	0,075-0,1 + 0,2% раствор ПАВ Адигор					
	0,0375- 0,075	Капуста бело- кочанная	Капустная моль	Опрыскивание в пе- риод вегетации	5	2
	0,05-0,1 + 0,2% раствор ПАВ Адигор	Огурец защи- щенного грунта	Паутинные клещи	Опрыскивание в пе- риод вегетации. Рас- ход рабочей жидко- сти 1000 л/га	3	2
РАДИАНТ, КС (спинеторам, 120 г/л), ООО «Кортева Агри- саенс Рус», Россия (Р), (П-1)	0,4-0,5	Кукуруза	Стеблевой куку- рузный мотылек	Опрыскивание в пе- риод вегетации	60	1
	0,6-0,7	Яблоня	Яблонная пло- дo- жорка	Опрыскивание в пе- риод вегетации	7	2
ФЛОКА ЭКСТРА, ВДГ (флоникамид, 500 г/кг), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,13-0,15	Яблоня	Тли, яблонная листовая галлица	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	3
ФУНГИЦИДЫ						
ИНСИГНИЯ, МД (ципродинил, 150 г/л + флудиоксонил, 140 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-3)	1	Яблоня	Гнили плодов при хранении	Опрыскивание в пе- риод созревания плодов: 1-е за 20 дней до сбора уро- жая, 2-е – через 7-10 дней после первого	3	2

КВИНТА, КЭ (пираклостробин, 200 г/л + ципрокона- зол, 100 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	0,4-0,6	Пшеница ози- мая	Септориоз ли- стьев	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,4-0,6	Горох посев- ной	Аскохитоз, муч- нистая роса	То же	36	1
ПРОФЕССОР МИКС, КЭ (спироксамин, 250 г/л + тебуконазол, 167 г/л + триадеми- нол, 43 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,5-0,6	Пшеница ози- мая	Септориоз, фуза- риоз колоса	Опрыскивание в пе- риод вегетации	73	1
РОНИЛАН, КС (азоксистробин, 150 г/л + дифенокона- зол, 125 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-З)	0,6-1	Рапс озимый	Альтернариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	39	2
СИНТРОН, КЭ (протиоконазол, 120 г/л + пиракло- стробин, 90 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-З)	0,8-1,2	Пшеница ози- мая	Септориоз ли- стьев	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,8-1,2	Тритикале ози- мая	Мучнистая роса	То же	30	1
	1	Ячмень ози- мый	То же	То же	30	1
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН						
РОНДАШ, МЭ (азоксистробин, 40 г/л + металаксил, 40 г/л + флудиоксо- нил, 25 г/л), АО Фирма «Август», Россия	1	Кукуруза	Плесневение се- мян, гнили про- ростков	Протравливание се- мян		
ФАКИР, КС (флудиоксонил, 250 г/л), АО «ФМРус», Россия	0,02	Картофель	Ризоктониоз	Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости 10 л/т		
ГЕРБИЦИДЫ						
АНТАРЕОН, МД (тиенкарбазон-метил, 15 г/л + никосульфур- он, 30 г/л + ципро- сульфамид, 22,5 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-З)	1-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые, однолет- ние двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры	115	1
КАПЕЛЬ, ВРК (МЦПА, 750 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,6-1,1	Картофель	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание поса- док до всходов культуры	104	1

МЕРИНДО , МД (мезосульфурон-метил, 20 г/л + йодосульфурон-метил-натрий, 4 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 60 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,7-0,8	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
МЕТРИБУТ , КС (метрибузин, 500 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-З)	0,8-1,4	Картофель	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы до всходов культуры	60	1
НИКОС , КС (никосульфурон, 40 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	1-1,25	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при 2-4 листьях у сорняков	60	1
	1,3-1,5		Однолетние и многолетние злаковые, некоторые однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при высоте многолетних сорняков 10-20 см		
САНВОРД ПЛЮС , КС (изоксафлютол, 225 г/л + тиенкарбазон-метил, 90 г/л + ципросульфамид (антидот), 150 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,3-0,4	Кукуруза	Однолетние двудольные, мятлик однолетний	Опрыскивание посевов в фазу всходы (шильца) до фазы 2-3 листьев культуры	60	1
	0,4		Многолетние злаковые	То же, при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4		Однолетние двудольные, многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 4-5 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см		
СЕРИАЛ , КС (ленацил, 500 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,8	Свекла сахарная (гибриды с устойчивостью к ацетолактатсинтазе (ALS))	Падалица рапса (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Двукратное опрыскивание в фазу 2-х настоящих листьев сорняков в смеси с препаратами-ингибиторами ацетолактатсинтазы (ALS)	90	2
ТЕРМЕК , СЭ (С-метолахлор, 375 г/л + тербутилазин, 125 г/л + мезотрион, 37,5 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	3-4	Кукуруза	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу всходы (шильца) до фазы 2-3 листьев культуры	60	1
	3-4		То же	Опрыскивание посевов в фазу 4-5 листьев культуры		

ТИМСПРЕЙ, СЭ (2,4-Д кислота 300 г/л в виде 2-этилгексисилового эфира, 452,4 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	60	1
ТРИУМФ, КЭ (этофумезат, 112 г/л + фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	1	Свекла сахарная <i>(не более 3 л/га)</i>	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье по мере появления новых сорняков в ту же фазу	106	3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое - в фазу 2-4 листьев сорняков; второе - по мере появления сорняков в ту же фазу		2
	3		То же	Однократное опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1
ТОПМАЗИН ПЛЮС, ВРК (дикамба, 160 г/л + топрамезон, 50 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,75-1	Кукуруза	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев культуры	60	1
	0,75-1,2		То же	Опрыскивание посевов в фазу 4-6 листьев культуры		
ФОМДОС, КС (флуфенацет, 400 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,4-0,6	Пшеница яровая	Некоторые однолетние двудольные (пастушья сумка, ярутка полевая, фиалка полевая, звездчатка средняя, ромашка непахучая)	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ						
ВЕКТОР, ВК (мепикват хлорид, 210 г/л + метконазол, 30 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд, Китай (Р), (П-З)	0,5-0,7	Рапс яровой	Снижение высоты растений, усиление побегообразования	Опрыскивание посевов в фазу 4 листьев культуры	40	1

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО КУЛЬТУРАМ И НАЗНАЧЕНИЮ						
ИНСЕКТИЦИДЫ						
АГЕНТ ПАУЕР, МКС (ацетамиприд, 320 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,05	Рапс яровой	Рапсовый цветод, семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации	91	1-2
АПЕКС, МКЭ (пирипроксифен, 100 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,35-0,5	Рапс яровой	Рапсовый цветод, семенной скрытнохоботник, капустная моль, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации	30	1-3
	0,2-0,3	Томат защищенного грунта (минеральная вата)	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	5	2
	0,2-0,3	Огурец защищенного грунта (минеральная вата)	То же	То же	3	2
АСПИД, СК (тиаклоприд, 480 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,15	Люпин узколистный	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации	21	1
БРАМБИ, ВДГ (сера, 700 г/кг + тебуконазол, 45 г/кг), ЮПЛ Холдинг Кооператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-3)	4-4,5	Яблоня	Плодовые клещи	Опрыскивание в период вегетации	40	3
ИМИДАШАНС ПЛЮС, СК (имидаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-1)	0,1-0,12	Пшеница, тритикале и ячмень озимые	Пьявицы, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	59	1
	0,1-0,12	Ячмень яровой	Злаковые мухи, хлебные блошки, пьявицы, листовые пилильщики	То же	89	1
	0,15-0,25	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	То же	60	1
КАЛИНА, КС (тиаклоприд, 480 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-2)	0,15	Горох посевной	Гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации	56	1
СТИЛЕТ, МД (индоксакарб, 100 г/л + абамектин, 40 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,5	Хвойные декоративные растения (ель, туя, можжевельник)	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней 0,05% рабочей жидкостью		2

ФАСШАНС, КЭ (альфа-циперметрин, 100 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-2)	0,1	Пшеница ози- мая	Пьявицы, листо- вые пилильщики	Опрыскивание в пе- риод вегетации	59	1
	0,1	Пшеница яро- вая	Злаковые мухи, хлебные блошки, пьявицы	То же	58	1-2
	0,1	Ячмень яровой, овес	Злаковые мухи, хлебные блошки, пьявицы, листо- вые пилильщики	То же	58	1-2
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	То же	20	2
	0,1	Лен-долгунец	Льняная блоха	То же	85	1
	0,2	Клевер луговой (семенные по- севы)	Клеверные се- мяеды, ситоны	То же	49	1
ЭФРОБЕЛ, КС (лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тиаметок- сам, 141 г/л), ООО «Белин», Россия (Р), (П-1)	0,15-0,2	Пшеница ози- мая	Пьявицы	Опрыскивание в пе- риод вегетации	50	1
	0,15-0,2	Ячмень яровой	Тли	То же	50	1
	0,15-0,25	Свекла сахар- ная	Свекловичная листовая тля , свекловичная минирующая муха	То же	60	1-2
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗАПАСОВ						
ШАРПЕЙ, МЭ (циперметрин, 250 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,8 мл/м ²	Незагружен- ные складские помещения и оборудование зерноперераба- тывающих предприятий	Вредители запас- сов, кроме кле- щей	Опрыскивание. Рас- ход рабочей жидко- сти до 50 мл на 1 м ² . Допуск людей и за- грузка складов че- рез 24 часа после обработки		1
	1,6 мл/м ²	Территория зерноперераба- тывающих предприятий и зернохранилищ	Вредители запас- сов, кроме кле- щей	Опрыскивание. Рас- ход рабочей жидкости до 200 мл на 1 м ²		1
ФУНГИЦИДЫ						
АЗУМАКС, ВДГ (каптан, 800 г/кг), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	1,5-1,8	Груша	Парша	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	6
БАКЛЕР, КМЭ (тебуконазол, 200 г/л + метконазол, 50 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Ячмень ози- мый	Мучнистая роса, сетчатая пятни- стость, карлико- вая ржавчина	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	1		Фузариоз колоса			
БРАМБИ, ВДГ (сера, 700 г/кг + тебу- коназол, 45 г/кг), ЮПЛ Холдинг Ко- оператив Ю.А., Ни- дерланды (Р), (П-3)	3,5-4,5	Ячмень ози- мый	Мучнистая роса, сетчатая пятни- стость, карлико- вая ржавчина	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	3,5-4,5	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятни- стость	То же	30	1
	1,5-2	Лен-долгунец	Фузариоз, ан- тракноз, пасмо	То же	30	2

	4-4,5	Яблоня	Парша, мучни- стая роса	То же	40	3
КАПЕЛЛА, МЭ (пропиконазол, 120 г/л + флутриафол, 60 г/л + дифенокона- зол, 30 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-З)	1	Хвойные деко- ративные рас- тения (туя, можжевельник, тис)	Инфекционный некроз побегов, шютте	Опрыскивание 0,2% рабочей жидкостью		4
	1	Сосна	Дотистромоз, обыкновенное шютте, склеро- дерриоз	То же		4
МЕДЕЯ, МЭ (дифеноконазол, 50 г/л + флутриафол, 30 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-З)	1,2	Сосна	Дотистромоз, склеродерриоз	Опрыскивание 0,24% рабочей жид- костью		4
МИРАВИС ГОЛД, СК (пидифлуметофен, 75 г/л + азоксистро- бин, 125 г/л + дифе- ноконазол, 125 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейца- рия (Р), (П-З)	0,75-1	Свекла сахар- ная	Церкоспороз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	35	2
	0,75-1	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, се- рая гниль	То же	63	2
НАВУРА, КЭ (мефентрифлукона- зол, 50 г/л + про- тиоконазол, 100 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	0,6-0,8	Тритикале ози- мая	Мучнистая роса, септориоз, фуза- риоз колоса	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,6	Ячмень ози- мый	Мучнистая роса, гельминтоспо- риоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,6	Рожь озимая	Ринхоспориоз	То же	30	1
	0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятни- стость, ринхос- пориоз, гельмин- тоспориоз и фу- зариоз колоса	То же	30	1
	0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость, ко- рончатая ржав- чина	То же	30	1
НОРТОН ПРО, СЭ (протиоконазол, 100 г/л + тебукона- зол, 200 г/л), ООО Группа Компа- ний «Землякофф», Россия (Р), (П-З)	0,5-0,7	Ячмень ози- мый	Мучнистая роса, сетчатая пятни- стость, ринхос- пориоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	56	1
	0,7-0,9		Гельминтоспо- риоз и фузариоз колоса			1
	0,5-0,7	Пшеница яро- вая	Мучнистая роса, септориоз ли- стьев	То же	36	1
	0,7-0,9		Септориоз и фу- зариоз колоса			1
	0,5-0,7	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятни- стость, темно- бурая	То же	36	1

			пятнистость, карликовая ржавчина			1
	0,7-0,9		Гельминтоспо- риоз и фузариоз колоса			
	0,6-0,8	Рапс яровой	Фомоз, росторе- гулирующее дей- ствие (стимуля- ция образования боковых побе- гов)	Опрыскивание посе- вов в фазу стеблева- ния	50	1
	0,6-0,8		Альтернариоз, склеротиниоз			
ОСКАР, КЭ (тебуконазол, 125 г/л + пираклостробин, 125 г/л), ООО Группа Компа- ний «Землякофф», Россия (Р), (П-З)	0,8-1,2	Ячмень ози- мый	Мучнистая роса, сетчатая пятни- стость, ринхос- пориоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	75	1
	0,8-1,2	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятни- стость, темно- бурая пятни- стость	То же	36	1
	0,8-1,2	Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз, фомоз	То же	64	1
	0,8-1,2	Горох посев- ной	Аскохитоз	То же	56	1
ПИЛАРВИВА, КС (протиоконазол, 170 г/л + пиракло- стробин, 170 г/л), Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,6-0,8	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	2
ПОЛИДОК, ВДГ (метирам, 700 г/кг), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	2,25	Груша	Парша, ржав- чина	Опрыскивание в пе- риод вегетации	60	4
ПРОПИШАНС УНИВЕРСАЛ, КМЭ (пропиконазол, 300 г/л + тебукона- зол, 200 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,4	Тритикале яро- вая	Мучнистая роса, септориоз ли- стьев, бурая ржавчина	Опрыскивание в пе- риод вегетации	57	1
	0,4		Септориоз и фу- зариоз колоса			
	0,3	Овес	Красно-бурая пятнистость, ко- рончатая ржав- чина	То же	52	1
	0,4-0,6	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	40	1
	0,4-0,6	Рапс яровой	То же	То же	40	1
	0,3-0,5	Горох посев- ной	Аскохитоз, муч- нистая роса	То же	49	1
	0,4-0,6	Свекла сахар- ная	Церкоспороз	То же	41	1

ПРОТИО ПРО, КС (азоксистробин, 160 г/л + протиоконзол, 200 г/л), ЮПЛ Холдингс Ко-оператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-З)	0,3-0,45	Ячмень яровой	Мучнистая роса, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	30	1
РЕКС ПРО, СЭ (мефентрифлуконазол, 150 г/л + фенпропиморф, 400 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	0,4	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	29	1
	0,4	Овес	Красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина	То же	29	1
РЕКС ТРИО, КЭ (флуксапироксад, 40 г/л + мефентрифлуконазол, 30 г/л + пираклостробин, 200 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	0,4	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,3	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,3	Пшеница яровая	Септориоз листьев, мучнистая роса	То же	29	1
	0,3	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса	То же	29	1
	0,3	Овес	Красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина	То же	29	1
	0,3	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз	То же	30	1-2
	0,3	Лен-долгунец	Антракноз, полиспороз, фомоз	То же	30	1
СИЗАРО, КЭ (протиоконзол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л), ДВА Агро ГмбХ, Германия (Р), (П-З)	0,8	Горох посевной	Аскохитоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	40	1
СТРОБИШАНС ПРО, СК (азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,5-0,75	Ячмень яровой	Мучнистая роса, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	51	1
	0,75-1	Рапс яровой	Альтернариоз	То же	50	1
	0,5-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	41	1
	0,45-0,5	Лен-долгунец	Антракноз, фузариоз, пасмо	То же	52	1
ТЕБАЗ ПРО, СК (азоксистробин, 200 г/л + тебуконазол, 250 г/л), ЮПЛ Холдингс Ко-оператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-З)	0,25-0,3	Лен-долгунец	Антракноз, фузариоз, пасмо	То же	30	2

ФАРГО, КС (тебуконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)	0,6-0,8	Рапс яровой	Фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция роста боковых побегов)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания	30	1
	0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации	31	2
	0,5-0,8	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль	То же	56	2
ФЕЯ, КЭ (протиокназол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,8-1	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации	30	1
ФИТОЦЕБ, ВДГ (манкоцеб, 750 г/кг), ООО «ФортисАгро», Беларусь (Р), (П-З)	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	40	5
ЭВКЛИД, СК (азоксистробин, 250 г/л + боскалид, 150 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,4	Люпин белый	Бурая пятнистость, серая гниль, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации	31	1-2
	0,3	Картофель	Альтернариоз	То же	21	1-2
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН						
АГЕНТ СУПЕР, СК (ацетамиприд, 200 г/л + фипронил, 100 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия	0,3-0,5	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней		
ИМИДАШАНС-С, КС (имидаклоприд, 600 г/л), ООО «Шанс», Россия	4-4,5	Рапс яровой	Крестоцветные блошки	Протравливание семян		
	0,8-1	Лен-долгунец	Льняная блоха	То же		
ОПЛОТ Трио, ВСК (дифеноконазол, 90 г/л + тебуконазол, 45 г/л + азоксистробин, 40 г/л), АО Фирма «Август», Россия	0,4-0,6	Люпин белый	Плесневение семян, корневая гниль	Протравливание семян		
	0,5-0,6	Люпин узколистный	Плесневение семян, корневая гниль, антракноз	То же		
СИНКЛЕР, СК (флудиоксонил, 75 г/л), АО Фирма «Август», Россия	0,6-0,7	Пшеница и тритикале озимые	Снежная плесень, корневая гниль	Протравливание семян		

ТАЙСОН, КС (тритиконазол, 80 г/л + пираклостробин, 40 г/л), ОАО «Гродно-райагросервис», Беларусь	0,4-0,5	Ячмень яровой	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Протравливание семян		
ФРАЗОЛ КЛАССИК, КС (тебуконазол, 60 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь	0,5	Пшеница озимая	Снежная плесень, корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян		
	0,5	Тритикале озимая	Плесневение семян, корневая гниль	То же		
ШАНСИЛ ТРИО, КС (тебуконазол, 60 г/л + тиабендазол, 60 г/л + имазалил, 40 г/л), ООО «Шанс», Россия	0,5-0,6	Овес	Плесневение семян, корневая гниль	Протравливание семян		
ШАНСИЛ УЛЬТРА, КС (тебуконазол, 120 г/л), ООО «Шанс», Россия	0,2-0,25	Овес	Плесневение семян, корневая гниль	Протравливание семян		
	0,2-0,25	Лен-долгунец	Антракноз, крапчатость, плесневение семян	То же		
ГЕРБИЦИДЫ						
АРГО ПРИМ, МЭ (феноксапроп-П-этил, 90 г/л + клодинафоп-пропаргил, 45 г/л + клоквинтосет-мексил (антидот), 40 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,4-0,55	Пшеница, тритикале и ячмень яровые	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	60	1
АГРОШАНС, ВК (смесь диметиламинной, калиевой, натриевой солей), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,7-1,2	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
	0,7-1,2	Пшеница и ячмень яровые с подсевом клевера	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения зерновых и в 1-2 тройчатых листа клевера	57	1
	0,5-0,8	Горох посевной	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры (высота растений 10-15 см)	30	1
	0,7-1,2	Лен масличный	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см	94	1
	1,2	Клевер луговой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры	30	1
	1-1,5	Тимофеевка луговая	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1

	0,9-1,7	Картофель	То же	Опрыскивание посадок до всходов культуры	99	1
БАЗАГРАН ПРО, ВР (бентазон, 480 г/л), БАСФ СЕ, Германия (Р), (П-3)	1,5-2,5	Пшеница озимая с подсевом клевера	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатого листа клевера (в фазу кущения пшеницы)	30	1
	1,5-2	Люцерна 2-го и последующих лет вегетации	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов при высоте люцерны 10-15 см	30	1
БАЛЛИСТА, МД (мезосульфурон-метил, 30 г/л + флу-метсулам, 17 г/л + флорасулам, 12 г/л + мефенпир-диэтил, 90 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,5	Тритикале озимая	Однолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот желтый, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кущения культуры	28	1
БУНТ, ВР (бентазон, 480 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	2-3	Соя	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	30	1
ВЫБОР, КЭ (клетодин, 360 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,26-0,3	Рапс озимый	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков	175	1
	0,33-0,5		Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,2-0,3	Свекла сахарная	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков	105	1
	0,5-0,6		Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,2-0,3	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков	57	1
ГАМБИТ, СК (прометрин, 500 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	3-4	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры	54	1
ГЕРБИСАН, СЭ (С-метолахлор, 375 г/л + тербутилазин, 125 г/л + мезотрион, 37,5 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-3)	3-4	Кукуруза сахарная	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу 2-3 листьев культуры	60	1
ГЕРБИТОКС, ВРК (МЦПА кислоты, 500 г/л), АО Фирма «Август», Россия	0,8-1	Картофель	Однолетние двудольные	Опрыскивание посадок после появления всходов при высоте культуры 10-15 см	40	1

(Р), (П-З)	1-1,5	Сенокосы и пастбища	То же	Опрыскивание в ранние фазы роста сорняков	21	1
ГИФФТРОН , КС (метамитрон, 700 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	1,5	Свекла столовая	Однолетние двудольные	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама	124	3
ИМАЗОШАНС , ВР (имазамокс, 40 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,75-1	Рапс яровой (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев). На следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин; рапс и подсолнечник, устойчивые к имидазолинонам	40	1
	0,75-1	Люцерна посевная 1-го года вегетации	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-4 тройчатых листьев культуры в ранние фазы роста сорняков	30	1
ЗЕНКОШАНС , КС (метрибузин, 600 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,35-0,45	Горох посевной	Марь белая, паслен черный, просо куриное	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	30	1
КВИКСТЕП , МКЭ (клетодим, 130 г/л + галоксифоп-Р-метил, 80 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,4-0,6	Горох посевной	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков (независимо от фазы развития культуры)	31	1
	0,6-0,8		Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		
	0,4-0,6	Соя	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков (независимо от фазы развития культуры)	31	1
	0,6-0,8		Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15		

				см (независимо от фазы развития культуры)		
	0,4-0,6	Лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков (независимо от фазы развития культуры)	60	1
	0,6-0,8		Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		
	0,4-0,6	Гречиха	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков (независимо от фазы развития культуры)	60	1
	0,6-0,8		Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		
КЕНТАВР , ВДГ (флукарбазон натрия, 700 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	40-60 г/га	Рожь озимая	Однолетние злаковые (метлица обыкновенная, мятлик однолетний), падалища рапса и некоторые однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	35	1
КОРСАР СУПЕР , ВРК (бентазон, 400 г/л + имазамокс, 25 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	1,2-1,6	Клевер 1-го года вегетации	Однолетние двудольные, мятлик однолетний	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков	31	1
ЛАЗУРИТ УЛЬТРА , СК (метрибузин, 600 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	1,25	Люцерна 2-го и последующих лет вегетации	Однолетние двудольные, мятлик однолетний	Опрыскивание посевов при высоте люцерны 10-15 см	30	1
ЛЕРАШАНС , ВР (клопиралид, 267 г/л+ пиклорам, 67 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,35	Рапс озимый	Виды осотов, ромашки, подмаренник цепкий	Опрыскивание посевов весной в фазу стеблевания	40	1
МОМУС , ВРК (МЦПА, 500 г/л (смесь диметиламинной, калиевой, натриевой солей)),	0,8-1	Лен-долгунец	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см	81	1
	0,6-0,9	Горох посевной	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5	60	1

ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)				настоящих листьев культуры (высота растений 10-15 см)		
	0,8-1,2	Люцерна посевная 1-го года вегетации	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры	30	1
НАНОШАНС , ВР (бентазон, 480 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	2-4	Пшеница и ячмень яровые с подсевом клевера	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу первого тройчатого листа клевера (в фазу кущения зерновых)	30	1
	2	Пшеница и ячмень яровые с подсевом люцерны	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 листьев люцерны (в фазу кущения зерновых)	30	1
	2-3	Клевер луговой 1-го и 2-го года вегетации	То же	Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры (высота 10-15 см)	30	1
НОПАСАРАН ФЛЕКС , ВРК (имазамокс, 17,5 г/л + квинмерак, 75 г/л + аминопиралид, 4 г/л), БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Пуэрто Рико (Р), (П-З)	1,4-1,6	Рапс яровой CL, (гибриды рапса Clearfield, устойчивые к гербициду)	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	61	1
ПРИШАНС , СЭ (2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этил-гексилового эфира, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,4-0,6	Овес	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры -выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры	30	1
РЕЙСЕР , КЭ (флуорохлоридон, 250 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-З)	1-1,5	Овес	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	30	1
СЕДИМ 120 , КЭ (клетодим, 120 г/л), ГЛОБАХЕМ Н.В., Бельгия (Р), (П-З)	0,8	Рапс озимый	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков	96	1
	1,5		Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,8	Свекла сахарная	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков	56	1
	1,8		Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,8	Лен-долгунец, лен масличный	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков	71	1

	1,8		Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		
	0,8	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры	61	1
	1,8		Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см		
СТАТУС КРОС, СЭ (пиноксаден, 45 г/л + флорасулам, 5 г/л + клоквинтосет-мексил, 12 г/л (антидот)), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-З)	0,7-0,9	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры		1
	0,7-0,9			Опрыскивание посевов весной от фазы кущения до стадии 2-х междоузлий культуры	116	1
	0,7-0,9	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кущения культуры	116	1
	0,7-0,9	Ячмень яровой	Однолетние двудольные, овсюг обыкновенный	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
СТИНГРЕЙ, КЭ (пиноксаден, 50 г/л + клоквинтосет-мексил, 12,5 г/л (антидот)), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,6-0,9	Ячмень озимый	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	35	1
	0,9-1,2			Опрыскивание посевов в фазу трубкования		
	0,9	Ячмень яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
	1,2			Опрыскивание посевов в фазу трубкования		
ТЕРРСАН, ВДГ (сульфометурон-метила кислоты, 750 г/кг), ООО «Агрозащита плюс», Беларусь; Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd, Китай (Р), (П-З)	0,1	Сосна обыкновенная, ель европейская, липа мелколистная (лесокультурные площади)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые, листовенная древесно-кустарниковая растительность	Обработка плужных борозд за 14 дней до посадки растений на лесокультурной площади методом УМО. Норма расхода рабочей жидкости – 1 л/га		1
ТРАНШ Супер, СК (метазахлор, 333 г/л + квинмерак, 83 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	1,5-2	Сурепица озимая	Однолетние двудольные и злаковые, в т.ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	40	1
	1,25-1,5	Гречиха	Однолетние двудольные, просо куриное	То же	60	1

ФОРТИССИМО, МД (2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 200 г/л + аминокпирилат, 10 г/л + флорасулам, 5 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,4-0,6	Тритикале озимая	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры	60	1
	0,4-0,6	Пшеница яровая	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	60	1
	0,4-0,6	Тритикале яровая	Однолетние двудольные	То же	60	1
ФРАНКОРН, КС (мезотрион, 480 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	0,2-0,3	Фацелия (семенные посевы)	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
ШАНСГАРД, КС (прометрин, 500 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	2-4	Подсолнечник	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	30	1
ШАНСТРЕЛ 300, ВР (клопирилат, 300 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,5	Тритикале озимая	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры	85	1
	0,3-0,5	Ячмень яровой	То же	То же	30	1
ЭВОКАТ, КЭ (квизалофоп-п-тефурил, 50 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-З)	0,7-0,9	Рапс озимый	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	30	1
	0,9-1,2		Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,7-0,9	Свекла сахарная	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	102	1
	0,9-1,2		Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,7-0,9	Горох	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	61	1
	0,9-1,2		Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,7-0,9	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	76	1
	0,9-1,2		Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см		
ДЕСИКАНТЫ						
ДИКОШАНС, ВР (дикват-ион, 150 г/л или в виде диквата дибромид, 279 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	1-1,5	Тритикале озимая	Опрыскивание посевов за 4-6 дней до уборки при влажности зерна не выше 30% для подсушивания зерна и подавления сорняков		6	1
	1-1,5	Ячмень яровой	Опрыскивание посевов за 4-6 дней до уборки при влажности зерна не выше 30% для подсушивания зерна и подавления сорняков		6	1
	1	Лен-долгунец	Опрыскивание посевов в фазу желтой спелости при побурении 85% коробочек		13	1

	2	Люпин узко-листный	Опрыскивание растений в период побурения 80% бобов		7	1
	2-2,5	Соя	Опрыскивание растений в период побурения 50-70% бобов		7	1
	1,5-2	Горох посев-ной	Опрыскивание посевов за 7-10 дней до уборки урожая		7	1
	4-5	Бобы кормовые	Опрыскивание посевов за 8-10 дней до уборки урожая		7	1
	4-5	Клевер луговой (семенные посе-вы)	Опрыскивание растений в период побу-рения 75-80% головок клевера		7	1
	2	Картофель	Опрыскивание посадок в период окон-чания формирования клубней и огруб-ления кожуры		9	1
СУХОВЕЙ, ВР (дикват-ион, 150 г/л в виде диквата дибро-мида, 280 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	2	Фацелия (се-менные по-севы)	Опрыскивание растений при естествен-ном побурении 70-80% созревших се-мян			1
БИОПРЕПАРАТЫ						
ВЕЛОНДИС, КС (титр не менее 2,2*10 ¹⁰ КОЭ/мл Bacillus amyloliquefa- ciens (velezensis) штамм MBI 600), БАСФ СЕ, Германия	1,6	Рапс яровой	Плесневение се-мян	Предпосевная обра-ботка семян		1
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ						
КОСТАНДО, КЭ (тринексапак-этил, 250 г/л), АО «Щелково Агро-хим», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,6	Ячмень ози-мый	Предотвращение полегания	Опрыскивание рас-тений в начале вы-хода в трубку (ста-дии ДК 30-31). Рас-ход рабочей жидко-сти 200 л/га	91	1
ТРИДУС, КЭ (тринексапак-этил, 250 г/л), ГЛОБАХЕМ Н.В., Бельгия (Р), (П-3)	0,4	Пшеница ози-мая <i>(максимальное количество об-работок - 2)</i>	То же	Опрыскивание посе-вов в начале выхода в трубку-образова-ния первого узла. Расход рабочей жидкости 200 л/га	60	1
	0,2			Опрыскивание посе-вов в начале выхода в трубку-образова-ния первого узла и в период появления последнего листа. Расход рабочей жидкости 200 л/га		2
	0,2-0,3	Пшеница яро-вая	То же	Опрыскивание посе-вов в конце куше-ния (ДК 29-30) при условии достаточ-ного или избыточ-ного содержания влаги в почве. Рас-ход рабочей жидко-сти 200 л/га	60	1
	0,3-0,6	Ячмень яровой	То же	Опрыскивание посе-вов в фазу начало	60	1

				выхода в трубку (стадии 31-32). Расход рабочей жидкости 200 л/га		
	0,3			Опрыскивание посевов в фазу начало выхода в трубку-образование второго междоузлия и в период появления последнего листа. Расход рабочей жидкости 200 л/га		2
	0,3-0,5	Рапс озимый	Росторегулирующее действие: улучшение перезимовки культуры, снижение высоты растений и снижение высоты точки роста, увеличение диаметра корневой шейки, массы корня и наземной части	Осеннее опрыскивание растений в фазу 4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200 л/га	40	1
РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ						
ИНСЕКТИЦИДЫ						
АГЕНТ ПАУЕР, МКС (ацетамиприд, 320 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-З)	0,05-0,1	Рапс озимый	Семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации	91	1
АПЕКС, МКЭ (пирипроксифен, 100 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,35-0,5	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	30	1-3
АСПИД, СК (тиаклоприд, 480 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,1-0,15	Рапс озимый	Рапсовый пилильщик	Опрыскивание в период вегетации	30	1
ИНЗАК ЗЕОН, МКС (ацетамиприд, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-2)	0,15-0,2	Рапс яровой	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации	60	2

ФУНГИЦИДЫ						
БРАМБИ , ВДГ (сера, 700 г/кг + тебуконазол, 45 г/кг), ЮПЛ Холдинг Ко-оператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-З)	3,5-4,5	Пшеница озимая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
НАВУРА , КЭ (мефентрифлуконазол, 50 г/л + пропиконазол, 100 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз и фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
НОРТОН ПРО , КЭ (пропионазол, 100 г/л + тебуконазол, 200 г/л), ООО Группа Компаний «Землякофф», Россия (Р), (П-З)	0,5-0,7	Пшеница озимая	Септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	56	1
ОСКАР , КЭ (тебуконазол, 125 г/л + пираклостробин, 125 г/л), ООО Группа Компаний «Землякофф», Россия (Р), (П-З)	0,8-1,2	Пшеница озимая	Септориоз листьев, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	75	1
	0,8-1,2	Пшеница яровая	Септориоз листьев, фузариоз колоса	То же	36	1
	0,8-1,2	Рапс озимый	Фомоз	То же	64	1
ПИЛАРВИВА , КС (пропионазол, 170 г/л + пираклостробин, 170 г/л), Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	30	2
ПРОПИШАНС УНИВЕРСАЛ , КМЭ (пропионазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,4	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз и фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	50	1
	0,3-0,4	Тритикале озимая	Септориоз и фузариоз колоса	То же	50	1
	0,3-0,4	Пшеница яровая	Септориоз и фузариоз колоса	То же	57	1
ПРОТИО ПРО , КС (азоксистробин, 160 г/л + пропиконазол, 200 г/л), ЮПЛ Холдингс Ко-оператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-З)	0,3-0,45	Пшеница озимая	Бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	30	1
ФАРГО , КС (тебуконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-З)	0,4-0,5	Пшеница озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5		Септориоз колоса			
	0,4	Рожь озимая	Бурая ржавчина	То же	30	1
	0,4-0,5	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	То же	30	1

ФЕЯ, КЭ (протиокназол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	То же	30	2
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Септориоз листьев, пиренофороз, бурая ржавчина	То же	30	2
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Карликовая ржавчина	То же	30	2
	0,6-0,8	Рапс озимый	Склеротиниоз	То же	30	1
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН						
ТАЙСОН, КС (тритиконазол, 80 г/л + пираклостробин, 40 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь	0,4-0,5	Пшеница яровая	Плесневение семян, корневая гниль	Протравливание семян		
ГЕРБИЦИДЫ						
БАЛЛИСТА, МД (мезосульфурон-метил, 30 г/л + флу-метсулам, 17 г/л + флорасулам, 12 г/л + мефенпир-диэтил, 90 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,5	Пшеница озимая	Бодяк полевой	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	28	1
НОПАСАРАН ФЛЕКС, ВРК (имазамокс, 17,5 г/л + квинмерак, 75 г/л + аминопиралид, 4 г/л), БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Пуэрто Рико (Р), (П-З)	1,4-1,6	Рапс озимый CL (гибриды рапса Clearfield, устойчивые к гербициду)	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры	30	1
ХАКЕР 300, ВР (клопиралид, 300 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды осота, ромашки	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры		1
ЭВОКАТ, КЭ (квизалофоп-п-тефурил, 50 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-З)	0,9-1,2	Рапс яровой	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см	30	1

УТОЧНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМЫ РАСХОДА						
ИНСЕКТИЦИДЫ						
АГЕНТ ПАУЕР, МКС (ацетамиприд, 320 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,05-0,1	Рапс озимый	Рапсовый цветод, семенной скрытнохоботник, капустный стручковый комарик	Опрыскивание в период вегетации	91	1-2
КАЛИНА, КС (тиаклоприд, 480 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-2)	0,2-0,3	Яблоня	Тли	Опрыскивание в период вегетации	10	3
ОРГАНЗА, КС (ацетамиприд, 100 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-2)	0,2-0,3	Рапс озимый	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик	Опрыскивание в период вегетации	53	1
СКУТУМ, СК (фипронил, 250 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,06-0,07	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание посевов в период вегетации	14	1-2
ТАНРЕК, ВРК (имidakлоприд, 200 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-1)	0,2 + 200 мл/га ПАВ Адью Ж	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание посевов в период вегетации	20	1
ФУНГИЦИДЫ						
КОЛОСАЛЬ, КЭ (тебуконазол, 250 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	1	Рапс озимый	Альтернариоз, корневые гнили, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4 настоящих листьев культуры	21	1
ОСКАР, КЭ (тебуконазол, 125 г/л + пираклостробин, 125 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,8-1,2	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации	64	1-2
НОРТОН ПРО, КЭ (протиоконзол, 100 г/л + тебуконазол, 200 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Рапс озимый	Альтернариоз, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 3-4 листьев культуры	52	1-2
	0,6-0,8		Фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов и	Опрыскивание весной в фазу стеблевания		

			образования стручков)			
ФЕЯ, КЭ (протиокназол, 125 г/л + тебукона- зол, 125 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,6-0,8	Пшеница ози- мая	Мучнистая роса, септориоз ли- стьев	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,8-1		Септориоз и фу- зариоз колоса			1
	0,6-0,8	Тритикале ози- мая	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1		Септориоз и фу- зариоз колоса			1
	0,6-0,8	Ячмень ози- мый и яровой	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1		Гельминтоспо- риоз и фузариоз колоса			1
	0,6-0,8	Пшеница яро- вая	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1		Септориоз и фу- зариоз колоса			1
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН						
ВИТАВАКС 200ФФ, ВСК (карбоксин, 170 г/л + тирам, 170 г/л), Ариста ЛайфСайенс Регистрейшнс Грейт Британ Лтд., Велико- британия	5	Ячмень яровой	Пыльная, камен- ная, черная пыльная (лож- ная) головня, корневая гниль, плесневение се- мян, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Протравливание се- мян		
ФОРС, МКС (тефлутрин, 200 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейца- рия	0,05 л на по-сев- ную еди- ницу (10 г д.в./ 100 000 семян)	Свекла сахар- ная	Проволочники	Протравливание се- мян		
ГЕРБИЦИДЫ						
БАЛЛИСТА, МД (мезосульфурон-ме- тил, 30 г/л + флу- метсулам, 17 г/л + флорасулам, 12 г/л + мефенпир-диэтил, 90 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,5	Пшеница ози- мая	Однолетние дву- дольные и злако- вые, бодяк поле- вой	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу кущения культуры	28	1
	0,3-0,5	Ячмень ози- мый	Однолетние дву- дольные и злако- вые, некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	То же	28	1
ВЫБОР, КЭ (клетодим, 360 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,33-0,5	Рапс яровой	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см	40	1

НОПАСАРАН ФЛЕКС, ВРК (имазамокс, 17,5 г/л + квинмерак, 75 г/л + аминопиралид, 4 г/л), БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Пуэрто Рико (Р), (П-З)	1,4-1,6	Рапс озимый CL, (гибриды рапса Clearfield, устойчивые к гербициду)	Однолетние дву- дольные, мятлик однолетний	Опрыскивание посе- вов весной в фазу стеблевания куль- туры	30	1
СЕДИМ 120, КЭ (клетохим, 120 г/л), ГЛОБАХЕМ Н.В., Бельгия (Р), (П-З)	0,8	Рапс яровой	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков	96	1
СТАТУС КРОС, СЭ (пиноксаден, 45 г/л + флорасулам, 5 г/л + клоквинтосет-мексил, 12 г/л (антидот)), ООО Группа Компа- ний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-З)	0,7-0,9	Пшеница яро- вая	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание посе- вов в фазу кушения культуры до фазы второго междоузлия	30	1
СТИНГРЕЙ, КЭ (пиноксаден, 50 г/л + клоквинтосет-мексил, 12,5 г/л (антидот)), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,9-1,2	Пшеница и тритикале ози- мые	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу трубкова- ния	35	1
ШАНТУС, ВДГ (римсульфурон, 250 г/кг), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	30 г/га + 200 мл/га ПАВ ШАНС- 90, Ж 20 г/га + 200 мл/га ПАВ ШАНС- 90, Ж	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые и некото- рые двудольные	Двукратное опрыс- кивание по первой и второй волне сорня- ков в фазу 2-6 ли- стьев культуры, при высоте пырея ползу- чего 10-15 см (ин- тервал 10-20 дней)	60	2
ШАНСТРЕЛ 300, ВР (клопиралид, 300 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,3	Рапс яровой	Виды осота, ро- машки, горца	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-4 ли- стьев культуры	40	1

РЕГИСТРАЦИЯ (на новый срок)						
ИНСЕКТИЦИДЫ						
ИМИДОР, ВРК (имidakлоприд, 200 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-1)	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	37	1
	0,3	Огурец защищенного грунта	Тли	То же	3	1
	0,6-0,7	Огурец и томат защищенного грунта	Белокрылка тепличная	То же		
	0,2-0,25	Яблоня	Листогрызущие гусеницы, тли	То же	20	1
	0,5	Роза и другие многолетние цветочные культуры	Сосущие и листогрызущие вредители	Опрыскивание растений 0,1% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 500 л/га		3
	0,5-0,8	Лиственные и хвойные	Сосущие, листогрызущие и хвоегрызущие насекомые	Опрыскивание в период вегетации 0,1-0,16 % рабочей жидкостью		1-2
	0,8	Сосна	Сосновый подкорный клоп, побеговьюны	Опрыскивание в период вегетации 0,16 % рабочей жидкостью		1-2
ФУНГИЦИДЫ						
КАРАМБА, КЭ (метконазол, 60 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-3) (окончание срока регистрации 03.2035)	1-1,5	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1,5	То же	Церкоспореллез	То же		
	1,5	Тритикале озимая	Фузариоз и септориоз колоса	То же	30	1
	1,25-1,5	То же	Церкоспореллез, корневые гнили	Опрыскивание посевов в фазу выхода в трубку (ст. 31-32)		
	1,25-1,5	То же	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации		
	1,25	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	30	1
	1,5	То же	Фузариоз и септориоз колоса	То же		
	1,25-1,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, фузариоз и альтернариоз колоса	То же	30	1
	0,8	Рапс яровой	Альтернариоз	То же	20	1
	0,8	Рапс озимый	Снежная плесень, корневая гниль, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4 настоящих листьев культуры	28	1-3
	0,8	То же	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации		
	0,8-1	То же	Росторегулирующее действие (снижение высоты растений рапса, образование большего	Опрыскивание весной в фазу роста стебля (стадия 30) культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.		

			количества боковых побегов)			
	0,6-0,8	Капуста белокочанная (маточные растения)	Серая гниль	Опрыскивание в фазу 4-6 листьев и перед закладкой на хранение		2
МЕТАМИЛ МЦ , СП в водорастворимых пакетах (манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3) (окончание срока регистрации 03.2035)	2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	30	3
	2-2,5	Лук репчатый	Пероноспороз	То же	28	3
	2-2,5	Чеснок озимый	То же	То же	20	3
	5	Смородина черная	Септориоз	То же	72	1
ФЛИНТ , ВСК (эпоксиконазол, 120 г/л + ципроконазол, 80 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3) (окончание срока регистрации 03.2035)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации		
	0,8	То же	Фузариоз и септориоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же		
	0,8	То же	Фузариоз и септориоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же		
	0,8	То же	Фузариоз и септориоз колоса	То же		
	0,6	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса	То же		
	0,8	То же	Фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же		
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН						
МАКСИМ КВАТРО , ТС (флудиоксонил, 37,5 г/л + азокси-стробин, 15 г/л + тиабендазол, 300 г/л + мефеноксам, 30 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (окончание срока регистрации 01.2035)	0,0136 л на посевную единицу	Кукуруза	Пузырчатая головня, плесневение семян, гниль проростков	Протравливание семян		

ГЕРБИЦИДЫ						
ГОЛТИКС ГОЛД, КС (метамитрон, 700 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-З) (окончание срока регистрации 01.2035)	5-6	Свекла сахарная (не более 6 л/га)	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры	67	1
	1,5		То же	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье - по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама		3
ЛОРНЕТ, ВР (клопиралид, 300 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З) (окончание срока регистрации 03.2035)	0,3-0,5	Пшеница и тритикале озимые, пшеница и ячмень яровые	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	30	1
	0,15-0,22	Гречиха	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы развития сорняков	30	1
	0,3-0,5	Свекла сахарная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 пар настоящих листьев культуры	86	1
	0,1-0,3	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна-долгунца и в фазу розетки осотов	28	1
	0,3-0,4	Рапс яровой и озимый	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры	28	1
	0,16-0,66	Газоны и газоны спортивных сооружений	Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, клевер, ромашка и др.)	Опрыскивание растений по вегетирующим растениям после первого укоса.		1
	0,4	Декоративные кустарники (кизильник, спирея), в т.ч. в населенных пунктах	Одуванчик, подорожник, бодяк, ромашка	Опрыскивание вегетирующих сорняков при условии защиты культуры		1
ПУЛЬСАР, ВР (имазамокс, 40 г/л), БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Пуэрто Рико (Р), (П-З)	0,75-1	Горох посевной	Однолетние двудольные и злаковые, некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих	30	1

(окончание срока регистрации 03.2035)				листьев). На следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сорго, сою, горох, бобы, люцерну, люпин; рапс и подсолнечник, устойчивые к имидазолиномам		
	0,75	Горох овощной	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посевов до всходов культуры	30	1
	0,75-1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	60	1
	0,75-1	Клевер луговой и ползучий в год посева без покрова	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры в ранние фазы роста сорняков		1
	0,75	Лядвенец рогатый	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	94	1
	0,75	Галега восточная	То же	То же	94	1
	1	Люпин узколистный	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	129	1
	1	Люцерна посевная	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-4 тройчатых листьев культуры в ранние фазы роста сорняков	29	1
ФЛУОРОН , ВДГ (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3) (окончание срока регистрации 01.2035)	30 г/га + 0,2 л/га ПАВ Альф, Ж	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Трехкратное опрыскивание посевов после появления всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сорняков	60	3
ЭВЕРЕСТ , ВДГ (флукарбазон натрия, 700 г/кг), Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция (Р), (П-3)	40-70 г/га	Пшеница озимая	Метлица обыкновенная; падалица рапса и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3-4 листа культуры или весной в фазу кущения культуры	60	1

(окончание срока регистрации 01.2035)	40-70 г/га	Тритикале озимая	Однолетние злаковые (метлица обыкновенная, просо куриное, овсюг обыкновенный), падалица рапса и некоторые двудольные	То же	60	1
	40-70 г/га	То же	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу флаг лист культуры		
	40-70 г/га	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (просо куриное, овсюг обыкновенный)	Опрыскивание посевов в фазу выхода в трубку культуры	60	1
	30-35 г/га	Свекла сахарная (гибриды с устойчивостью к ацетолактат-синтазе (ALS))	Щетинник сизый	Двукратное опрыскивание: первое – в фазу 2-настоящих листьев сорняков; второе – по мере появления новых сорняков в ту же фазу. Применять в смеси с препаратами – ингибиторами ацетолактат-синтазы (ALS)	60	2

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ЗАМАЗКА САДОВАЯ ЛЕЧЕБНАЯ, пластичная масса (аммоний-медь-фосфат + нефтепродукты + канифоль), ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», Беларусь (окончание срока регистрации 01.2035)		Яблоня	Для заживления ран деревьев после обрезки, повреждений бактериальным, черным и обыкновенным европейским раком, солнечных ожогов	Обработка срезов деревьев после прививки, окулировки и обрезки ветвей. Под пораженным деревом расстилают полиэтиленовую пленку. Ножом зачищают пораженное место до здоровой древесины с удалением почерневшей растрескавшейся коры. Затем рану при помощи деревянной лопатки замазывают лечебной садовой замазкой		
--	--	--------	---	---	--	--

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

Презжнее название заявителя	Новое название заявителя
Закрытое акционерное общество «Белнефлесорб», Беларусь	ООО «Белнефлесорб», Беларусь
Регуляторы роста растений: Регулятор роста растений «Тандем, 10% ж. (гуминовые вещества, комплекс фитогормонов ауксиновой и цитокининовой природы)	

**ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ,
РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

<i>Торговое название, препаративная форма, действующее веще- ство, заявитель</i>	<i>Норма рас- хода препарата</i>	<i>Культура, обрабатывае- мые объекты</i>	<i>Вредный организм, заболевание, назначение</i>	<i>Способ, время обработки, ограничения</i>	<i>Срок по- следней обра- ботки (в днях до сбора урожая)</i>	<i>Крат- ность, в скобках – срок вы- хода лю- дей после обра- ботки (сутки)</i>
ИНСЕКТИЦИДЫ						
АЛЬФАЦИН, КЭ (альфа-ципермет- рин, 100 г/л), Иностранное обще- ство с ограничен- ной ответствен- ностью «Валбрента кемикалс», Бела- русь (Р), (П-1)	0,7-1 на 3 л воды	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание рас- тений в период веге- тации. Расход рабо- чей жидкости 3 л на 100 м ²	75	2
АПЕКС, МКЭ (пирипроксифен, 100 г/л), АО «Щелково Аг- рохим», Россия (Р), (П-3)	2-3 мл на 10 л воды	Томат защи- щенного грунта (минеральная вата)	Тепличная бело- крылка	Опрыскивание в пе- риод вегетации при появлении вреди- теля с интервалом 10 дней.	5	2(1)
	2-3 мл на 10 л воды	Огурец защи- щенного грунта (минеральная вата)	Тепличная бело- крылка	То же	3	2(1)
ИМИДОР, ВРК (имidakлоприд, 200 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (П-1)	1 мл на 3 л воды на 100 м ²	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в пе- риод вегетации. Рас- ход рабочей жидко- сти 2,5 л на 100 м ²	1(3)	37
	3 мл на 10 л воды на 100 м ²	Огурец защи- щенного грунта	Тли	Опрыскивание в пе- риод вегетации	1(1)	3
	6-7 мл на 10 л воды (на 100 м ²)	Огурец и томат защищенного грунта	Белокрылка теп- личная	То же		
	4-5 мл на 10 л воды	Яблоня	Листогрызущие гусеницы, тли	То же	1(1)	20
	10 мл на 10 л воды	Роза и другие многолетние цветочные куль- туры	Сосущие и листо- грызущие насеко- мые	Опрыскивание в пе- риод вегетации. Рас- ход рабочей жидко- сти – 5 л на 100 м ²	3(3)	
	10-16 мл на 10 л воды	Лиственные и хвойные	Сосущие, листо- грызущие и хвое- грызущие насеко- мые	Опрыскивание в пе- риод вегетации	1-2(3)	
	16 мл на 10 л воды	Сосна	Сосновый под- корный клоп, по- беговыюны	То же	1-2(3)	

ТАНРЕК , ВРК (имидаклоприд, 200 г/л), АО Фирма «Ав- густ», Россия (Р), (П-1)	2 мл + 2 мл ПАВ Адыо, Ж на 3 л воды 100 м ²	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание посе- вов в период вегета- ции		1
ФУНГИЦИДЫ						
ИНСИГНИЯ , МД (ципродинил, 150 г/л + флудиок- сонил, 140 г/л), АО «Щелково Аг- рохим», Россия (Р), (П-3)	10 мл на 8 л воды	Яблоня	Гнили плодов при хранении	Опрыскивание в пе- риодсозревания пло- дов: 1-е за 20 дней до сбора урожая, 2-е – через 7-10 дней после первого	3	2 (3)
МЕДЕЯ , МЭ (дифеноконазол, 50 г/л + флутри- афол, 30 г/л), АО «Щелково Аг- рохим», Россия (Р), (П-3)	12 мл на 5 л воды на 100 м ²	Сосна	Дотистромоз, склеродерриоз	Опрыскивание 0,24% рабочей жид- костью	-	4(7)
РИДОМИЛ ГОЛД Р , ВДГ (мефеноксам, 20 г/кг + медь, 142 г/кг (хлорокись меди, 258 г/кг)), Сингента Кроп Протекш АГ, Швейцария (Р), (П-3)	40-50 г на 4 л воды на 100 м ²	Картофель	Фитофтороз, аль- тернариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	7	3 (3)
	40-50 г на 4 л воды на 100 м ²	Томат откры- того грунта	То же	То же	5	2 (3)
	40-50 г на 4 л воды на 100 м ²	Огурец откры- того грунта	Пероноспороз	То же	3	2 (3)
ГЕРБИЦИДЫ						
ЛОРНЕТ , ВР (клопиралид, 300 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	1,6-6,6 мл на 3 л воды	Газоны	Однолетние и многолетние дву- дольные (одуван- чик, подорожник, щавель, тысяче- листник, клевер, ромашка и др.)	Опрыскивание тра- востоя через 3-4 дня после скашивания газона. Расход рабо- чей жидкости 3 л/100 м ²	1(3)	
	4 мл на 3 л воды на 100 м ²	Декоративные кустарники, (ки- зильник, спи- рея), в т.ч. в населенных пунктах	Одуванчик, подо- рожник, бодяк, ромашка	Опрыскивание веге- тирующих сорняков при условии защиты культуры	1(3)	

УДОБРЕНИЯ

+ – удобрение разрешено для применения субъектами хозяйствования и для применения и розничной продажи населению

Л – удобрение разрешено для применения и розничной продажи населению

Наименование удобрения, препаративная форма, заявитель, страна	Состав	Культуры	Примечание
НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ			
Азотные удобрения			
Сульфат аммония, Г , Закрытое акционерное общество «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», Беларусь (Производитель: Закрытое акционерное общество «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», Беларусь)	N _{общ.} – не менее 14%; S – не менее 10%	Зеленные культуры открытого грунта	+
Сульфат аммония гранулированный, Г , Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Минеральные удобрения», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Минеральные удобрения», Беларусь)	N – не менее 21%; S – не менее 24%	Рапс и другие крестоцветные	
Комплексные удобрения			
Водорастворимое комплексное минеральное удобрение «Акварин», марка 8 , смесь порошка и гранул, ОАО «Буйский химический завод», Россия (Производитель: ОАО «Буйский химический завод», Россия)	N – не менее 19%; P ₂ O ₅ – не менее 6%; K ₂ O – не менее 20%; MgO – не менее 1,5%; S – не менее 1,4%; Fe – 0,054%; Mn – 0,042%; Zn – 0,014%; Cu – 0,01%; Mo – 0,004%; B – 0,02%	Плодовые семечковые, листовые кустарники, хвойные кустарники и деревья	+
ГИСИНАР РКМg, ВРК , ООО «ШАУЭР ГРУПП», Беларусь (Производитель: ООО «ШАУЭР ГРУПП», Беларусь)	N – не менее 20 г/л; P ₂ O ₅ – не менее 210 г/л; K ₂ O – не менее 280 г/л; Mg – не менее 50 г/л	Свекла сахарная и кормовая	
ДР ГРИН-КАЧЕСТВО, ВРП , ООО ДР ГРИН, Польша (Производитель: ООО ДР ГРИН, Польша)	P ₂ O ₅ – 50%; K ₂ O – 34%	Озимые зерновые культуры, кукуруза	
Жидкое комплексное минеральное удобрение «Фосфорно-калийное», Ж , Частное производственное унитарное предприятие «Биохим», Беларусь (Производитель: Частное производственное унитарное предприятие «Биохим», Беларусь)	P ₂ O ₅ – 10-15%; K ₂ O – 21-27%	Пасленовые овощные культуры открытого грунта, зеленные культуры защищенного грунта	+
Жидкое минеральное универсальное удобрение «Сила природы», Ж , Частное производственное унитарное предприятие «Биохим», Беларусь (Производитель: Частное производственное унитарное предприятие «Биохим», Беларусь)	N – 14-16%; P ₂ O ₅ – 14-16%; K ₂ O – 14-16%	Картофель, зеленные культуры защищенного грунта	+

Моноаммонийфосфат водорастворимый, высший сорт , кристаллический продукт, АО «Апатит», Россия (Производитель: АО «Апатит», Россия)	N – 12±1%; P ₂ O ₅ – 61±1%	Яровые зерновые культуры, картофель	+
Удобрение минеральное комплексное гранулированное, марка «Интенс 34-11» , Г, ООО «Белагроферт», Беларусь (Производитель: ООО «Белагроферт», Беларусь)	N – 33-35%; S – 10-12%	Зеленные культуры защищенного грунта	+
Удобрение «Экофорс» , Ж, ООО «ЭКОБИО УДОБРЕНИЕ», Беларусь (Производитель: ООО «ЭКОБИО УДОБРЕНИЕ», Беларусь)	N _{общ.} – не менее 4,5%; K ₂ O – не менее 0,34%	Яровые зерновые культуры (предпосевная обработка семян, некорневые подкормки), свекла сахарная и кормовая	
Ультрамаг марка Калий , Ж, АО «Щелково Агрохим», Россия (Производитель: АО «Щелково Агрохим», Россия)	N _{общ.} – 2,6±0,8%; K ₂ O – 22±2%	Озимые и яровые зерновые культуры, рапс и другие крестоцветные, свекла сахарная и кормовая	
Микроудобрения			
Ультрамаг Супер Цинк-700 , Ж, АО «Щелково Агрохим», Россия (Производитель: АО «Щелково Агрохим», Россия)	N _{общ.} – 1,5±0,7%; Zn – 40±3%	Кукуруза	
Ультрамаг Хелат, марка Мп-13 , м.г., АО «Щелково Агрохим», Россия (Производитель: АО «Щелково Агрохим», Россия)	N _{общ.} – 6,5±1,5%; Mn – 13±1,5%	Рапс и другие крестоцветные, свекла сахарная и кормовая	
ЭКОСТИМ МАРГАНЕЦ , ВРК, ООО «ШАУЭР ГРУПП», Беларусь (Производитель: ООО «ШАУЭР ГРУПП», Беларусь)	N – не менее 30 г/л; Mn – не менее 160 г/л	Яровые зерновые культуры, свекла сахарная и кормовая	
Микробиологические удобрения			
Препарат микробный «ЩудаМик» , Ж, Институт микробиологии НАН Беларуси, Беларусь (Производитель: Институт микробиологии НАН Беларуси, Беларусь)	Общий титр жизнеспособных клеток, не менее: Sphingobium yanoikuyae БИМ В-2081Д, Pseudomonas siliginis БИМ В-2083Д – 1 *10 ⁹ КОЕ/мл	Свекла сахарная и кормовая	+
Органические удобрения			
Зоогумус , рассыпчатый продукт, Частное биотехнологическое унитарное предприятие «АлникорБио», Беларусь (Производитель: Частное биотехнологическое унитарное предприятие «АлникорБио», Беларусь)	Массовая доля, %, не менее: сухой остаток – 80; органическое вещество – 75; N _{общ.} – 2; P ₂ O ₅ – 2; K ₂ O – 1,5	Зеленные культуры защищенного грунта	+
Удобрение органическое «Щучинское» , однородная масса, Щучинский филиал ОАО «Молочный Мир», Беларусь (Производитель: Щучинский филиал ОАО «Молочный Мир», Беларусь)	Массовая доля сухого вещества – 33-40%; массовая доля органического вещества на сухое вещество – не менее 40%; массовая доля на сухое вещество, %: N _{общ.} – не менее 1,4; P ₂ O ₅ – не менее 1; K ₂ O – не менее 0,3	Кукуруза	
Органоминеральные удобрения			

Жидкое органоминеральное удобрение ВитаеПро, ВК, ЗАО «Агроорганика», Литва (Производитель: ЗАО «Агроорганика», Литва)		%, не менее: N _{общ.} – 1; P ₂ O ₅ – 0,08; K ₂ O – 0,05; органическое вещество – 2	Кукуруза	
Жидкое органоминеральное удобрение ГумиПро, ВК, ЗАО «Агроорганика», Литва (Производитель: ЗАО «Агроорганика», Литва)		%, не менее: N _{общ.} – 0,5; P ₂ O ₅ – 0,08; K ₂ O – 5; органическое вещество – 24; гуминовые кислоты – 5,5	Озимые зерновые культуры	
Жидкое органоминеральное удобрение ТерраПро, ВК, ЗАО «Агроорганика», Литва (Производитель: ЗАО «Агроорганика», Литва)		%, не менее: N _{общ.} – 1; P ₂ O ₅ – 0,08; K ₂ O – 0,05; органическое вещество – 24,5; гуминовые кислоты – 1,7	Кукуруза	
РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ				
<i>Комплексные удобрения</i>				
Диаммонийфосфат удобрительный, марка 15-45, Г, ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь (Производитель: ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь)		N _{общ.} – 15±1%; P ₂ O ₅ – 45±1%	Яровые зерновые культуры	
			Рапс и другие крестоцветные, картофель	+
Диаммонийфосфат удобрительный, марка 16-43, Г, ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь (Производитель: ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь)		N _{общ.} – 16±1%; P ₂ O ₅ – 43±1%	Яровые зерновые культуры	
			Рапс и другие крестоцветные, картофель	+
ДР ГРИН-КУКУРУЗА, ВРП, ООО ДР ГРИН, Польша (Производитель: ООО ДР ГРИН, Польша)		MgO – 2%; SO ₃ – 25%; B – 0,5%; Cu – 0,2%; Fe – 6%; Mn – 7%; Mo – 0,05%; Zn – 8%	Лен, картофель	
ИКАР Са235, ВРК, ООО «ТСП-ПЛИОС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)		CaO – 230-257 г/л	Плодовые семечковые, ягодные культуры	+
ИКАР Mg100 Про, ВРК, ООО «ТСП-ПЛИОС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)		N – 55-82 г/л; MgO – 89,1-116,4 г/л	Яровые зерновые культуры	
ИКАР Zn Про, ВРК, ООО «ТСП-ПЛИОС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)		N – 60,3-90,4 г/л; Mn – 5,5-8,2 г/л; Zn – 151-178 г/л	Яровые зерновые культуры, кукуруза	
ИКАР ИНТЕНС НРК 0-42-9+Mn+Cu+Fe+Zn, ВРК, ООО «ТСП-ПЛИОС», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)		P ₂ O ₅ – 370-430 г/л; K ₂ O – 80-105 г/л; Fe – 3,6-4,8 г/л; Mn – 18-24 г/л; Cu – 15-18 г/л; Zn – 12-16,5 г/л	Свекла сахарная и кормовая	
Нитрат калия, кристаллы, Общество с ограниченной ответственностью «Компания БКМ», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания БКМ», Беларусь)	марка А	N – 13,5%; K ₂ O – 46%	Тыквенные овощные культуры открытого и защищенного грунта	+
	марка Б	N – 13,5%; K ₂ O – 44,5%		

Удобрение комплексное, марка N:K 24-0-3, Г, Общество с ограниченной ответственностью «Компания БКМ», Беларусь (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания БКМ», Беларусь)	N – 24%; K ₂ O – 3%	Озимые зерновые культуры, рапс и другие крестоцветные, свекла сахарная и кормовая	
Удобрение смешанное «Добрая Сила» марка 10, Г, АО «РУСИНХИМ», Россия (Производитель: АО «РУСИНХИМ», Россия)	N _{общ} – не менее 3%; P ₂ O ₅ – не менее 3%; K ₂ O – не менее 3%; SiO ₂ – не менее 15%	Ягодные культуры	Л
Удобрение смешанное «Добрая Сила» марка 18, Г, АО «РУСИНХИМ», Россия (Производитель: АО «РУСИНХИМ», Россия)	N _{общ} – не менее 1%; P ₂ O ₅ – не менее 5%; K ₂ O – не менее 6%; SiO ₂ – не менее 21%	Плодовые семечковые	Л
Удобрение «Хелакор» Зерновые комплекс, ЖК, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	N _{общ.} – не менее 9,2 г/л; P ₂ O ₅ – не менее 96 г/л; K ₂ O – не менее 80 г/л; Zn – не менее 10 г/л; Mn – не менее 10 г/л; Cu – не менее 5,5 г/л; Mo – не менее 0,15 г/л	Озимые и яровые зерновые культуры	
Удобрение «Хелакор» комплекс Бобовые, ЖК, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	N _{общ.} – не менее 7 г/л; P ₂ O ₅ – не менее 83 г/л; K ₂ O – не менее 103 г/л; Zn – не менее 15 г/л; Fe – не менее 10 г/л; Mn – не менее 5 г/л; Cu – не менее 2 г/л; Mo – не менее 0,15 г/л; B – не менее 9 г/л	Зернобобовые культуры	
Удобрение «Хелакор» комплекс Железо+Цинк, ЖК, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	N _{общ.} – не менее 52 г/л; Zn – не менее 20 г/л; Fe – не менее 20 г/л	Плодовые семечковые и косточковые, ягодные культуры	+
Удобрение «Хелакор» комплекс Зерновые ДУО Cu+Mn, ЖК, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	N _{общ.} – не менее 9,2 г/л; Mn – не менее 30 г/л; Cu – не менее 25 г/л	Озимые и яровые зерновые культуры	
Удобрение «Хелакор» комплекс Овощи, ЖК, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	N _{общ.} – не менее 5,5 г/л; P ₂ O ₅ – не менее 79 г/л; K ₂ O – не менее 83 г/л; Zn – не менее 25 г/л; Fe – не менее 15 г/л; Mn – не менее 10 г/л; Cu – не менее 9 г/л; Mo – не менее 0,1 г/л; B – не менее 10 г/л	Капуста, пасленовые овощные культуры открытого грунта	+

Удобрение «Хелакор» комплекс Рапс, ЖК, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	N _{общ.} – не менее 5 г/л; P ₂ O ₅ – не менее 83 г/л; K ₂ O – не менее 57 г/л; Mn – не менее 20 г/л; Cu – не менее 20 г/л; Zn – не менее 12 г/л; B – не менее 6 г/л; Mo – не менее 0,15 г/л; Fe – не менее 15 г/л	Рапс и другие крестоцветные	
Удобрение «Хелакор» комплекс Свекла БОР, ЖК, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	N _{общ.} – не менее 30 г/л; P ₂ O ₅ – не менее 87 г/л; K ₂ O – не менее 90 г/л; Mn – не менее 20 г/л; Cu – не менее 4 г/л; Zn – не менее 6 г/л; B – не менее 30 г/л; Fe – не менее 15 г/л	Свекла сахарная и кормовая	
Удобрение «Хелакор» моно цинк Кукуруза, ЖК, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	N _{общ.} – не менее 66 г/л; Zn – не менее 30 г/л	Кукуруза	
Микроудобрения			
ВИТА КОРРЕКТ МИКРОС, ВРГ, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: BIOVITA FERTILIZER S.L.U., Испания)	Zn – 10,4±1,04%; Mn – 7±0,7%; MgO – 7±0,7%; Cu – 0,5±0,05%	Плодовые семечковые	+
ДР ГРИН-БОРНЫЙ, ВРП, ООО ДР ГРИН, Польша (Производитель: ООО ДР ГРИН, Польша)	SO ₃ – 7,5%; B – 12%; Fe – 5%	Лен	
Магний сернокислый (сульфат магния), марка В, КРП, ОАО «Буйский химический завод», Россия (Производитель: ОАО «Буйский химический завод», Россия)	MgO – не менее 16,5%; S – не менее 13%	Озимые и яровые зерновые культуры, кукуруза, рапс и другие крестоцветные	
Органоминеральные удобрения			
Амалгерол Эссенс, Ж, Хехенбихлер ГмбХ, Австрия (Производитель: Хехенбихлер ГмбХ, Австрия)	N – 3-3,6%; K ₂ O – 3,2-3,8%; органическое вещество – 36-40%	Озимые зерновые культуры (предпосевная обработка семян)	
ВИТА КОРРЕКТ БОР, ВРК, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: BIOVITA FERTILIZER S.L.U., Испания)	В (в комплексе с этаноламином) – 150±11 г/л; органическое вещество – 246±18 г/л	Рапс и другие крестоцветные	
		Плодовые семечковые	+
ИКАР Са200+В, ВРК, ООО «ТСП-ПЛИОС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	B – 16-24 г/л; СаО – 188-214 г/л; аминокислота L-пролин – 5,4-8 г/л	Плодовые семечковые, ягодные культуры	+
ИКАР NB 7-17+Mo+Co, ВРК, ООО «ТСП-ПЛИОС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	N – 57-85 г/л; B – 142-170 г/л; Co – 0,0023-0,0034 г/л; Mo – 5,7-8,5 г/л; полисахариды – 22,8-34 г/л	Рапс и другие крестоцветные	

ИКАР ИмуноФит Про , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	P ₂ O ₅ – 217-242 г/л; K ₂ O – 192-216 г/л; Cu – 5,1-7,6 г/л; молочная кислота – 28,1-40,8 г/л; салициловая кислота – 1,02-1,53 г/л	Яровые зерновые культуры, кукуруза, рапс и другие крестоцветные	
		Картофель	+
РЕВИТЕ ФЕРТ , ВРК, ООО «ВалдисАгро», Беларусь (Производитель: BIOVITA FERTILIZER S.L.U., Испания)	N _{общ.} – 118±9,5 г/л; свободные аминокислоты – 125±10 г/л; органическое вещество – 525±42 г/л, в т.ч. фульвокислоты – 125±10 г/л	Лен (предпосевная обработка семян)	
СЕРВАНИТРО СТАР , ВРП, BioDose Sp. z o.o. Sp.k., Польша (Производитель: SERVALESA, S.L.U., Испания)	N – 12-15%; свободные аминокислоты – 82-85%	Озимые зерновые культуры, рапс и другие крестоцветные, свекла сахарная и кормовая	
Удобрение минеральное НРК+Mg+Si+MЭ Марка 5:12:14 , Г, Акционерное общество «РУСИНХИМ», Россия (Производитель: Акционерное общество «РУСИНХИМ», Россия)	%, не менее: N – 5; P ₂ O ₅ – 12; K ₂ O – 14; SiO ₂ – 20; MgO – 0,3; CaO – 0,25; Fe – 0,005; Mn – 0,002; B – 0,0005; Zn – 0,001; Cu – 0,0002; Mo – 0,0002; янтарная кислота – 0,03; никотиновая кислота (витамин PP) – 0,002; тиамин (витамин B1) – 0,01; аскорбиновая кислота (витамин C) – 0,01; пиридоксин (витамин B6) – 0,02; цианокобаламин (витамин B12) – 0,001	Ягодные культуры	+
Удобрение органосеросодержащее «СатоСоил Феникс - 30/70 , Г, ЗАО «Органик фарминг Бел», Беларусь (Производитель: ЗАО «Органик фарминг Бел», Беларусь)	SO ₃ – не менее 260 г/кг; CaO – не менее 220 г/кг; P ₂ O ₅ – не менее 9 г/кг; гуминовые вещества – не менее 20 г/кг	Яровые зерновые культуры, кукуруза	
Удобрения на основе гуминовых кислот			
Гумат Рост , Ж, ООО «Торговый Дом Торфяные Гуматы», Беларусь (Производитель: ООО «РостПродуктАгро», Россия; ООО «Торговый Дом Торфяные Гуматы», Беларусь)	Сумма гуминовых и фульвокислот – не менее 30 г/л; N _{общ.} – не менее 0,7 г/л; P ₂ O ₅ – 0,02 г/л; K ₂ O – 2-7 г/л	Озимые зерновые культуры, кукуруза, зернобобовые культуры, многолетние злаковые и бобовые травы	+
ИКАР Блэк Перл , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	K ₂ O – 26,5-39 г/л; гуминовые кислоты – 121-143 г/л; фульвовые кислоты – 26,5-39 г/л	Яровые зерновые культуры	
		Картофель	+
Фитогумин , Ж, ОДО «АГРОСЕМПРОДУКТ», Беларусь (Производитель: ОДО «АГРОСЕМПРОДУКТ», Беларусь)	г/л, не менее: гуминовые вещества – 40; N – 1,4; P ₂ O ₅ – 0,7; K ₂ O – 9,8 мг/л, не менее: Ca – 544; Fe – 529; Mg – 80; Mn – 2,9; Cu – 1,05; Zn – 0,9; B – 0,07	Яровые зерновые культуры, кукуруза, рапс и другие крестоцветные, свекла сахарная и кормовая	
		Картофель	+

РЕГИСТРАЦИЯ (на новый срок)			
<i>Азотные удобрения</i>			
Нитрат кальция концентрированный, Г, АО «ОХК «УРАЛХИМ», Россия (Производитель: Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ», Россия в г. Кирово-Чепецке, Россия)	N _{общ.} – 17±1%; CaO – не менее 32%	Картофель, тыквенные и пасленовые овощные культуры защищенного грунта, плодовые семечковые, земляника садовая	+
<i>Органоминеральные удобрения</i>			
Максимус АминоПерфект, КРП, «ЭКОПЛОН общество с ограниченной ответственностью коммандитное общество», Польша (Производитель: «ЭКОПЛОН общество с ограниченной ответственностью коммандитное общество», Польша)	N _{общ.} – 4,3%; MgO – 5,45%; SO ₃ – 10,7%; Mn – 1,8%; B – 1,8%; Zn – 3,6%; Cu – 0,45%; Fe – 2%; Mo – 0,015%; всего аминокислот – 38,6%; свободные аминокислоты – 8,6%	Озимые зерновые культуры, рапс и другие крестоцветные	
<i>Удобрения на основе гуминовых кислот</i>			
Жидкий Гуминовый Торфо-Сапропелевый Концентрат «ЭридГроу», Ж, СООО «ЭридГроу Продакшн», Беларусь (Производитель: СООО «ЭридГроу Продакшн», Беларусь)	N – не менее 8%; P ₂ O ₅ – не менее 0,15%; K ₂ O – не менее 0,1%; органические вещества – не менее 65%; гуминовые кислоты – не менее 40%	Лиственные кустарники, роза открытого грунта, бархатцы, газонные травы	+
Препарат гуминовый «Гидрогумин», Ж, Частное производственное унитарное предприятие «БИОХИМ», Беларусь (Производитель: Частное производственное унитарное предприятие «БИОХИМ», Беларусь)	Сухое вещество – не менее 4%; гуминовое вещество – не менее 20% на сухое вещество; N – 0,1-3,5%; P ₂ O ₅ – 0,1-2; K ₂ O – 0,1-5%;	Яровые зерновые культуры, свекла сахарная и кормовая, лен	
		Картофель, капуста, столовые корнеплоды, лук защищенного грунта, тыквенные и пасленовые овощные культуры защищенного грунта, рассада овощных культур, однолетние цветочно-декоративные растения открытого грунта	+
Удобрение гуминовое «БИОВЕРМТЕХНО натуральное», Ж, ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь (Производитель: ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь; ООО «Агровисторг», Беларусь)	Гуминовые кислоты – не менее 1,5 г/л. %, не менее: N – 1,2; P ₂ O ₅ – 1,5; K ₂ O – 1,4%	Озимые и яровые зерновые культуры, кукуруза, рапс и другие крестоцветные (предпосевная обработка семян, некорневые подкормки), свекла сахарная и кормовая, лен, плодовые семечковые	
		Картофель, капуста, лук, чеснок, тыквенные овощные культуры открытого грунта, зеленные культуры защищенного грунта (предпосевная обработка семян, некорневые подкормки), столовые корнеплоды, пасленовые овощные культуры открытого грунта, редис защищенного грунта, земляника садовая	+

Удобрение гуминовое «БИОВЕРМ-ТЕХНО с микроэлементами», Ж, ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь (Производитель: ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь; ООО «Агровисторг», Беларусь)	Гуминовые кислоты – не менее 60 г/л. %, не менее: N - 20; P ₂ O ₅ - 17; K ₂ O – 17; B – 11; Ca – 1,6; Zn – 11; Fe – 11; Mo – 1,95; Na – 14,5; Co – 0,15; Mg – 4,5; Cu – 11,5; Mn – 11,5; S – 1,9	Яровые зерновые культуры, картофель (предпосевная обработка семян, некорневые подкормки), свекла сахарная и кормовая, столовые корнеплоды	+
		Арбуз (предпосевная обработка семян, некорневые подкормки), фиалка	

УДОБРЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ФАСОВАНИЯ	
Азотные удобрения	
Карбамид марка Б, Г, АО «НАК «Азот», Россия (Производитель: АО «НАК «Азот», Россия)	ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», Беларусь ТУ ВУ 400048086.060-2023 Регистрация до 29.01.2027
Селитра аммиачная марка Б, Г, АО «НАК «Азот», Россия (Производитель: АО «НАК «Азот», Россия)	ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», Беларусь ТУ ВУ 400048086.055-2022 Регистрация до 29.01.2027
Сульфат аммония, Г, Закрытое акционерное общество «Белорусская наци- ональная биотехнологическая корпорация», Беларусь (Производитель: Закрытое акционерное общество «Белорусская наци- ональная биотехнологическая корпорация», Бела- русь)	ООО «БиоКлин», Беларусь ТУ ВУ 691845313.002-2024 Регистрация до 09.01.2027
Сульфат аммония гранулированный, Г, ООО «Агроснаб», Россия (Производитель: ООО «Агроснаб», Россия)	ООО «ИНТЕРПРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 31.12.2030
Калийные удобрения	
Калий хлористый (марка мелкий, ССП, ОАО «Беларуськалий», Беларусь (Производитель: ОАО «Беларуськалий», Беларусь)	ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», Беларусь ТУ ВУ 400048086.063-2024 Регистрация до 16.01.2026
Микроудобрения	
ЛИГОПЛЕКС Са, Ж, Биолким С.п.А., Италия (Производитель: Биолким С.п.А., Италия)	ООО «ИНТЕРПРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 31.12.2027
Органоминеральные удобрения	
КРИСС, Ж, Биолким С.п.А., Италия (Производитель: Биолким С.п.А., Италия)	ООО «ИНТЕРПРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 31.12.2027
СПРИНТАЛГА, Ж, Биолким С.п.А., Италия (Производитель: Биолким С.п.А., Италия)	ООО «ИНТЕРПРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 31.12.2027
ФИЛЛОТОН, Ж, Биолким С.п.А., Италия (Производитель: Биолким С.п.А., Италия)	ООО «ИНТЕРПРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 31.12.2027
ФОЛИЦИСТ, Ж, Биолким С.п.А., Италия (Производитель: Биолким С.п.А., Италия)	ООО «ИНТЕРПРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 31.12.2027

ФУЛЬВУМИН, Ж, Биолким С.п.А., Италия (Производитель: Биолким С.п.А., Италия)	ООО «ИНТЕРПРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 31.12.2027
--	---

ИЗМЕНЕНИЕ ТОРГОВОГО НАЗВАНИЯ УДОБРЕНИЙ			
Прежнее название		Новое название	
Мелиорант песчаных почв торфолигнинный жидкий, Ж, СООО «ЭридГроу Продакшн», Беларусь (Производитель: СООО «ЭридГроу Продакшн», Беларусь)	Активизатор почвы ЭридГроу ЖГАП-К	Жидкий Гуминовый Торфо-сапропелевый Концентрат «ЭридГроу», Ж, СООО «ЭридГроу Продакшн», Беларусь (Производитель: СООО «ЭридГроу Продакшн», Беларусь)	
ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ УДОБРЕНИЯ			
Прежнее название		Новое название	
БиоФерт В150, Ж, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)		БиоФерт В150, Ж, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)	
БиоФерт Mg100 Про, Ж, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)		БиоФерт Mg100 Про, Ж, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)	
БиоФерт Mn230, Ж, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)		БиоФерт Mn230, Ж, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)	
БиоФерт S, Ж, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)		БиоФерт S, Ж, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)	
БиоФерт Zn230, Ж, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)		БиоФерт Zn230, Ж, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)	
БиоФерт АминоПро, Ж, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)		БиоФерт АминоПро, Ж, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)	
БиоФерт Микс Про, Ж, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)		БиоФерт Микс Про, Ж, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Vitera Polska Sp. z.o.o, Польша)	
ИКАР, ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	NB 7-17	ИКАР, ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	NB 7-17
	NB 7-17+0,7Mo		NB 7-17+0,7Mo
ИКАР Cu200, ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)		ИКАР Cu200, ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	
ИКАР Mo300, ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)		ИКАР Mo300, ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	
ИКАР БИГО марка: Ливс весна-лето, ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)		ИКАР БИГО марка: Ливс весна-лето, ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)	

ИКАР БИГО марка: Ливс осень-зима , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)	ИКАР БИГО марка: Ливс осень-зима , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)
ИКАР БИГО марка: Рутс , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)	ИКАР БИГО марка: Рутс , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)
ИКАР ИНТЕНС НРК 0-21-28+Амино , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)	ИКАР ИНТЕНС НРК 0-21-28+Амино , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)
ИКАР ИНТЕНС НРК 0-42-21+2,8MgO , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)	ИКАР ИНТЕНС НРК 0-42-21+2,8MgO , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)
ИКАР ИНТЕНС НРК 4-21-29+25SO₃ , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)	ИКАР ИНТЕНС НРК 4-21-29+25SO₃ , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)
ИКАР ЗИНТО , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	ИКАР ЗИНТО , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)
ИКАР КАЛИСИ , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	ИКАР КАЛИСИ , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)
ИКАР КАЛИСТО , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	ИКАР КАЛИСТО , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)
ИКАР КОРАЛ , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	ИКАР КОРАЛ , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)
ИКАР МЕНДЕЛЕНИУМ , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)	ИКАР МЕНДЕЛЕНИУМ , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)
ИКАР РЕВОЛТ , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)	ИКАР РЕВОЛТ , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)
ИКАР ФОСТО , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	ИКАР ФОСТО , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)
ИКАР ХИГО марка: Инфра , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)	ИКАР ХИГО марка: Инфра , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)
ИКАР ХИГО марка: Инфра Лайт , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)	ИКАР ХИГО марка: Инфра Лайт , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)
ИКАР ХИГО марка: Колд , ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)	ИКАР ХИГО марка: Колд , ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: АО «Икарай», Литва)

ИКАР ЭНЗО, ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)		ИКАР ЭНЗО, ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	
ИКАР ЭЛАИС, ВРК, ООО «ТСП-ПЛЮС», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)		ИКАР ЭЛАИС, ВРК, ООО «Икарай-Бел», Беларусь (Производитель: Ikarai UAB, Литва)	
Удобрение гуминовое «БИОВЕРМ-ТЕХНО», Ж, ИП Мазейко Сергей Игоревич, Бела- русь; ИП Мазейко Виктор Данилович, Бела- русь ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь (Производитель: ИП Мазейко Сергей Игоревич, Бела- русь; ИП Мазейко Виктор Данилович, Бела- русь; ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь; ООО «Агровисторг», Беларусь)	натуральное	Удобрение гуминовое «БИОВЕРМТЕХНО натураль- ное», Ж, ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь (Производитель: ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь; ООО «Агровисторг», Беларусь)	
Удобрение гуминовое «БИОВЕРМ-ТЕХНО», Ж, ИП Мазейко Сергей Игоревич, Бела- русь; ИП Мазейко Виктор Данилович, Бела- русь ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь (Производитель: ИП Мазейко Сергей Игоревич, Бела- русь; ИП Мазейко Виктор Данилович, Бела- русь; ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь; ООО «Агровисторг», Беларусь)	с микро-эlemen- тами	Удобрение гуминовое «БИОВЕРМТЕХНО с микроэле- ментами», Ж, ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь (Производитель: ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь; ООО «Агровисторг», Беларусь)	
ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УДОБРЕНИЯ			
<i>Прежнее название</i>		<i>Новое название</i>	
Удобрение гуминовое «БИОВЕРМ-ТЕХНО», Ж, ИП Мазейко Сергей Игоревич, Бела- русь; ИП Мазейко Виктор Данилович, Бела- русь ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь (Производитель: ИП Мазейко Сергей Игоревич, Бела- русь; ИП Мазейко Виктор Данилович, Бела- русь; ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь; ООО «Агровисторг», Беларусь)	натуральное	Удобрение гуминовое «БИОВЕРМТЕХНО натураль- ное», Ж, ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь (Производитель: ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь; ООО «Агровисторг», Беларусь)	

Удобрение гуминовое «БИОВЕРМ-ТЕХНО», Ж, ИП Мазейко Сергей Игоревич, Беларусь; ИП Мазейко Виктор Данилович, Беларусь ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь (Производитель: ИП Мазейко Сергей Игоревич, Беларусь; ИП Мазейко Виктор Данилович, Беларусь; ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь; ООО «Агровисторг», Беларусь)	с микро-элементами	Удобрение гуминовое «БИОВЕРМТЕХНО с микроэлементами», Ж, ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь (Производитель: ООО «БИОВЕРМТЕХНО», Беларусь; ООО «Агровисторг», Беларусь)
--	---------------------------	--