

ДОПОЛНЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕЕСТРУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
И УДОБРЕНИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(27 августа 2025 г.)

Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, заявитель	Норма расхода препарата (л, кг/га, л, кг/т)	Культура, обрабатываемые объекты	Вредный организм, назначение	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)	Кратность обработок
НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ						
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗАПАСОВ						
ЦЕПЕЛЛИН ЭДВАНС, КЭ (лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ООО Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-1)	0,4 мл/м²	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 50 мл на 1 м². Допуск людей и загрузка складов через 2 суток после обработки.		
	0,8 мл/м²	Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах	То же	Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 200 мл на 1 м²		
ГЕРБИЦИДЫ						
АРГУМЕНТ, ВР (глифосата кислоты, 360 г/л в виде изопропиламинной соли, 480 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	2-3	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) и в населенных пунктах	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
АЛХИМИК, КЭ (феноксапроп-П-этил, 140 г/л + клоди-нафоп-пропаргил, 90 г/л + флоквинто-сет-мексил (антидот), 60 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,4-0,6	Пшеница яровая	Просо куриное	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	30	1

КЛОФОЦЕТ, МД (клодинафоп-пропаргил, 120 г/л + флукарбазон натрия, 60 г/л + клоквинтосет-мексил (антидот), 54 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,5-0,8	Пшеница яровая	Просо куриное	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	30	1
ДЕСИКАНТЫ						
ХИТОН, ВР (дикват, 200 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	1,5-2,25	Рапс яровой	Опрыскивание посевов при естественном созревании 80% стручков при влажности маслосемян не более 25%		6	1
БИОПРЕПАРАТЫ						
ЖУКОЕД Био, СК (спиносад, 240 г/л), АО Фирма «Август», Россия (П-1)	1,2	Огурец защищенного грунта	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации 0,12% раствором. Расход рабочего раствора 1000 л/га	3	2
РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО КУЛЬТУРАМ						
ИНСЕКТИЦИДЫ						
ИНЗАК ЗЕОН, МКС (ацетамиприд, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-2)	0,15-0,2	Пшеница озимая	Клопы, пиявицы, листовые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	14	1
	0,15-0,2	Тритикале озимая	Клопы, пиявицы, листовые пилильщики	То же	14	1
	0,2		Хлебные жуки			
	0,15-0,2	Ячмень яровой	Хлебные блошки, злаковые мухи, пиявицы, листовые пилильщики	То же	35	1-2
СНЕИР, МКС (хлорантрелипрол, 200 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,15-0,2	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, западный кукурузный жук	Опрыскивание в период вегетации	27	1
	0,15-0,2	Рапс озимый	Капустная моль	То же	91	1
	0,15-0,3	Яблоня	Листогрызущие гусеницы, минирующие моли, яблонная плодожорка	То же	21	2
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗАПАСОВ						
ФУМИФАСТ, ТАБ (алюминия фосфид, 560 г/кг), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия	5 г/м ³	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов, кроме клещей	Фумигация при температуре воздуха + 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция - 5 суток. Дегазация не менее 2 суток. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК		
	6 г/м ³	Крупа и мука в складах или под пленкой	То же	Фумигация при температуре наружного воздуха и продукта - выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки.		

				Экспозиция 5 суток для насекомых. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК		
	5 г/м³	Сухие овощи в складах или под пленкой	То же	Фумигация при температуре наружного воздуха и продукта - выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых. Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК		
ФУНГИЦИДЫ						
ПРЕГАРД, КС (флуазинам, 500 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,5-0,75	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации	20	4
ГЕРБИЦИДЫ						
АЙМОКС, ВРГ (клопиралид, 750 г/кг) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,12-0,15	Рапс озимый	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры	40	1
	0,12-0,16	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна и в фазу розетки осотов	79	1
	0,12-0,2	Свекла сахарная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры	109	1
КИРАЙ, ВР (клопиралид, 267 г/л + пиклорам, 67 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,3-0,35	Рапс озимый	Виды осотов, ромашки, горцев, подмаренник цепкий	Опрыскивание посевов весной в фазу стеблевания	40	1
	0,3-0,35	Капуста кочанная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры	85	1
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ						
ЭКОСТИМ, ВК (тритерпеновые кислоты, не менее 70 г/л; L-аминокислоты, не менее 30 г/л), ООО «ШАУЭР ГРУПП», Беларусь (Р), (П-3)	0,08 л/га	Кукуруза	Повышение урожайности	Опрыскивание посевов в фазу 4-6 листьев культуры. Расход рабочего раствора 200 л/га		1
	0,06 л/га	Рапс яровой	Повышение урожайности	Опрыскивание посевов в фазу 3-8 листьев культуры и в начале цветения. Расход рабочего раствора 200 л/га		2

	0,06 л/га	Горох посев- ной	Повышение уро- жайности	Опрыскивание посе- вов в фазу стеблева- ния культуры. Рас- ход рабочего рас- твора 200 л/га		1
РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ						
ФУНГИЦИДЫ						
ЭКВИНОКС, КС (боскалид, 250 г/л + дифеноконазол, 150 г/л), ООО Группа Компа- ний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Рапс озимый и яровой	Фомоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	61	1
УТОЧНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ НОРМЫ РАСХОДА						
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ						
Регулятор роста растений «Тандем», 10% ж. (гуминовые вещества, комплекс фитогормонов аукси- новой и цитокинино- вой природы), ООО «Белнефте- сорб», Беларусь (П-3)	1	Рапс яровой	Стимуляция ро- ста и развития, повышение уро- жайности и каче- ства семян	Предпосевная обработка семян. Рас- ход рабочей жидкости 10 л/т		
	0,3	Лен-долгунец	Стимуляция ро- ста и развития, повышение уро- жайности	Предпосевная обработка семян. Рас- ход рабочей жидкости 8 л/т		
РЕГИСТРАЦИЯ (на новый срок)						
ИНСЕКТИЦИДЫ						
МОВЕНТО, КС (спиротетрамат, 100 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3) (окончание срока ре- гистрации 06.2035)	0,8-1	Огурец защи- щенного грунта	Белокрылка теп- личная, обыкно- венный паутин- ный клещ, трипс табачный, тли	Опрыскивание в пе- риод вегетации 0,08-0,1% рабочей жидкостью с интер- валом 7-14 дней при высоте растений до 1 м и начальном за- селении вредите- лями. Расход рабо- чей жидкости 1000 л/га	2	3
	1,5		Обыкновенный паутинный клещ, трипс та- бачный	Опрыскивание в пе- риод вегетации 0,15% рабочей жид- костью с интерва- лом 7 дней при вы- соте растений от 1 м и начальном заселе- нии вредителем. Расход рабочей жидкости 1000 л/га		
	0,8-1	Томат защи- щенного грунта (максимальное количество об- работок – 3)	Белокрылка теп- личная	Опрыскивание в пе- риод вегетации 0,08-0,1% рабочей жидкостью с интер- валом 7-14 дней при высоте растений до 1 м и начальном за-	3	2-3

				селении вредите- лем. Расход рабочей жидкости 1000 л/га		
	1,5			Опрыскивание в пе- риод вегетации 0,15% рабочей жид- костью с интерва- лом 7-14 дней при высоте растений от 1 м и начальном за- селении вредите- лем. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	3	3
	0,75	Смородина черная	Смородинный почковый клещ, смородинная тля	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	2
МОВЕНТО ЭНЕР- ДЖИ, КС (спиротетрамат, 120 г/л + имидакло- прид, 120 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-2) (окончание срока ре- гистрации 06.2035)	0,4-0,6	Картофель	Колорадский жук, тли	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	2
	0,4-0,6	Капуста кочан- ная	Тля капустная	Опрыскивание в пе- риод вегетации с интервалом 7-14 су- ток	21	2
	0,6-0,8	Яблоня	Тли	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	3
	0,8-1		Плодовые клещи, яблонная листовая галлица			
	0,6-0,8	Груша	Медяницы	То же	20	2
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗАПАСОВ						
КЛИМАТ серная дымовая шашка (сера, 750 г/кг), АО «ТПК Техноэкс- порт», Россия (окончание срока ре- гистрации 06.2035)	300 г на 10 м³	Пустые по- греба, овоще- хранилища, плодохрани- лища, картофе- лехранилища, зернохрани- лища, винные погреба, сено- хранилища, се- новалы	Вредные насеко- мые, клещи, воз- будители гриб- ных и бактери- альных болезней	Фумигация сернистым ангидридом пустых помещений не позднее, чем за 5 дней до закладки продукции на хранение. Экспозиция – 24-36 часов. Дегазация –24-48 часов		
	300 г на 20 м³	Пустые пар- ники, теплицы, оранжереи	То же	Фумигация сернистым ангидридом пустых помещений перед посадкой рассады. Экспозиция –24-36 часов. Дегазация – до 10 суток		
ФУНГИЦИДЫ						
АНТРАКОЛ, ВДГ (пропинеб, 700 г/кг), Байер АГ, Германия (Р), (П-3) (окончание срока ре- гистрации 06.2035)	1,75	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	5
	1,5	Томат откры- того грунта	То же	То же	7	4
	2	Томат защи- щенного грунта	То же	То же	7	3
	1,75-2,25	Лук репчатый (кроме лука на перо)	Пероноспороз	То же	18	3
	2-2,5	Яблоня	Парша	То же	20	4

ЛУНА ЭКСПИРИЕНС, КС (флуопирам, 200 г/л + тебуконазол, 200 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3) (окончание срока ре- гистрации 06.2035)	0,5-0,75	Яблоня (максимальное количество об- работок – 4)	Мучнистая роса, плодовая гниль	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	3
	0,75		Парша	То же		
	0,75		Гнили плодов при хранении	Опрыскивание за 20 дней до уборки уро- жая	20	1
	0,75-1	Капуста кочан- ная (максимальное количество об- работок – 2)	Альтернариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	25	1-2
	1		Болезни кочанов во время хране- ния	Последовательные обработки: - опрыскивание в фазу формирования кочана; - за 25 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости 400 л/га	25	2
	0,5-0,75	Морковь	Бурая пятни- стость листьев	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	2
	0,75		Болезни корне- плодов во время хранения	Последовательные обработки: первая - опрыскива- ние в период вегета- ции; вторая - за 20 дней до уборки. Расход рабочей жидкости 300 л/га		
	0,5-0,6	Огурец защи- щенного грунта	Мучнистая роса	Последовательные обработки 0,05- 0,06%-ой рабочей жидкостью: первая – при первых при- знаках развития бо- лезни; последую- щие – с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	3	3
	0,5-0,75	Малина	Антракноз, серая гниль	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	2
	0,5-0,6	Голубика	Рак стеблей	То же	20	2
	0,6		Фомопсисное увядание стеб- лей			
СКАЙВЭЙ ХПРО, КЭ (биксафен, 75 г/л + протиоконазол, 100 г/л + тебуконазол, 100 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3) (окончание срока ре- гистрации 06.2035)	0,8-1,25	Пшеница ози- мая	Мучнистая роса, септориоз ли- стьев, фузариоз колоса	Опрыскивание в пе- риод вегетации	41	1
	0,8-1,25	Тритикале ози- мая	Фузариоз колоса	То же	41	1
	0,8-1,25	Пшеница яро- вая	Мучнистая роса, септориоз ли- стьев, фузариоз колоса	То же	42	1
	1-1,25		Септориоз ко- лоса	То же		

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН						
БАРИТОН СУПЕР, КС (флудиоксонил, 37,5 г/л + протиоконазол, 50 г/л + тебуконазол, 10 г/л), Байер АГ, Германия (окончание срока регистрации 06.2035)	1-1,2	Пшеница озимая	Твердая головня, снежная плесень, корневая гниль, плесневение семян		Протравливание семян	
	1-1,2	Тритикале озимая	Снежная плесень, корневая гниль, плесневение семян, спорынья		То же	
	0,8-1	Рожь озимая	Снежная плесень, плесневение семян		То же	
	0,8-1	Пшеница яровая	Плесневение семян		То же	
	1	Ячмень озимый	Снежная плесень, корневая гниль, плесневение семян		То же	
	0,8-1	Ячмень яровой	Корневая гниль, плесневение семян		То же	
ГЕРБИЦИДЫ						
КОМПЛИТ ФОРТЕ, КС (дифлюфеникан, 233 г/л + флуфенацет, 200 г/л + метрибузин, 83 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3) (окончание срока регистрации 06.2035)	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью до всходов культуры или в фазу 1-3 листьев культуры	30	1
	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры	30	
	0,4-0,6	Рожь озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью до всходов – в фазу 3 листьев культуры	30	1
	0,4-0,6	Ячмень озимый	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3-4 листьев культуры	30	1
	0,6	Тритикале озимая с подсевом клевера	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3 листа - начало кушения	30	1

**ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ,
РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

<i>Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, заявитель</i>	<i>Норма расхода препарата</i>	<i>Растения, обрабатываемые объекты</i>	<i>Вредный организм, заболевание, назначение</i>	<i>Способ, время обработки, ограничения</i>	<i>Кратность, в скобках – срок выхода людей после обработки (сутки)</i>	<i>Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)</i>
ИНСЕКТИЦИДЫ						
ЗЕМЛИН, Г (диазинон, 50 г/кг), АО «ТПК Техноэкспорт», Россия (Р) (окончание регистрации 07.2035 г.)	30 г на 10 м ²	Картофель	Проволочники	Внесение гранул препарата в почву (лунки) перед посадкой	1(3)	30
		Капуста белокачанная	Весенняя капустная муха	Внесение гранул препарата на поверхность почвы при высадке рассады капусты в грунт с одновременным рыхлением	1(3)	54

		Лук репчатый (кроме лука на перо)	Луковая муха	Внесение гранул препарата на поверхность почвы при высадке севка с одновременным рыхлением	1(3)	65
МАКСИМ, КС (флудиоксонил, 25 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария	2-4 мл на 100 мл воды	Тюльпан, нарцисс	Серая гниль, фузариоз	Обработка луковиц перед посадкой. Расход рабочей жидкости 100 мл на 1 кг посадочного материала	1(3)	
БИОПРЕПАРАТЫ						
ЖУКОЕД Био, СК (спиносад, 240 г/л), АО Фирма «Август», Россия (П-1)	12 мл на 10 л воды	Огурец защищенного грунта	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации 0,12% раствором	2 (3)	3

ФАСОВКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (для применения и розничной продажи населению)	
Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, фирма	Фасовщик
ФУНГИЦИДЫ	
РИДОМИЛ ГОЛД Р, ВДГ (мефеноксам, 20 г/кг + медь, 142 г/кг (хлорокись меди, 258 г/кг)), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария	Фасовка ООО «ФортисАгро», Беларусь ТУ ВУ 692151878.001-2020 регистрация до 12.2034

ИЗМЕНЕНИЕ ТОРГОВОГО НАЗВАНИЯ	
<i>Прежнее торговое название</i>	<i>Новое торговое название</i>
РЕКС ПРО, СЭ (мефентрифлуконазол, 150 г/л + фенпропиморф, 400 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария	КЕЙРА, СЭ (мефентрифлуконазол, 150 г/л + фенпропиморф, 400 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	
<i>Прежнее название заявителя</i>	<i>Новое название заявителя</i>
Глобахем Н.В., Бельгия	ГЛОБАКЕМ НВ, Бельгия
Фунгициды: ИППОН, КС; КАЛЬДЕРА, ВДГ Гербициды: СЕДИМ 120, КЭ; БУРЕКС 430 СЦ, СК Регуляторы роста растений: ТРИДУС, КЭ	

УДОБРЕНИЯ

+ – удобрение разрешено для применения субъектами хозяйствования и для применения и розничной продажи населению

Л – удобрение разрешено для применения и розничной продажи населению

Наименование удобрения, препаративная форма, заявитель, страна	Состав	Культуры	Примечание
НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ			
<i>Азотные удобрения</i>			
Сульфат аммония гранулированный, Г, ООО «Икспенс», Беларусь (Производитель: ООО «Терминал-Лысьва», Россия)	N – не менее 21%; S – не менее 22%	Свекла сахарная и кормовая	
Удобрение азотное Раслин марка NS, Ж, ООО «АгроФертКом», Беларусь (Производитель: ООО «АгроФертКом», Беларусь)	г/л (г/дм ³): N _{общ.} – 390; SO ₄ – 70	Зеленные культуры открытого грунта	+
Удобрение ЭлияХим марка «Нитрат кальция, стандарт – 27,2%», ССП, ООО «ЭлияХим», Беларусь (Производитель: ООО «ЭлияХим», Беларусь)	N – 14%; CaO – 27,2%	Зеленные культуры защищенного грунта	+
<i>Калийные удобрения</i>			
Калия сульфат, I сорт, КРП, ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», Беларусь (Производитель: ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», Беларусь)	K ₂ O – не менее 50%	Тыквенные и пасленовые овощные культуры защищенного грунта	+
Удобрение калийное Раслин марка Калий 500, Ж, ООО «АгроФертКом», Беларусь (Производитель: ООО «АгроФертКом», Беларусь)	г/л (г/дм ³): K ₂ O – 500. Аминокислоты – 1%	Зеленные культуры открытого грунта	+
<i>Комплексные удобрения</i>			
Удобрение комплексное Раслин марка Фонс, Ж, ООО «АгроФертКом», Беларусь (Производитель: ООО «АгроФертКом», Беларусь)	г/л (г/дм ³): P ₂ O ₅ – 300; K ₂ O – 150; SO ₄ – 100-110. Фитогормоны – 0,001-0,03%	Зеленные культуры открытого грунта	+
<i>Микроудобрения</i>			
Микроудобрение «Наноплант-І. Йод», Ж, НТООО «АКТЕХ», Беларусь (Производитель: НТООО «АКТЕХ», Беларусь)	г/л, не менее: I – 1; Cu – 1	Зеленные культуры защищенного грунта	+
Микроудобрение «Наноплант-Mg-Ca-B», Ж, НТООО «АКТЕХ», Беларусь (Производитель: НТООО «АКТЕХ», Беларусь)	г/л, не менее: Mg – 4; Ca – 6; B – 1,5	Зеленные культуры и рассада овощных культур защищенного грунта	+

Микроудобрение «Хелакор» моно БОР-150, ЖК, Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь (Производитель: Частное унитарное предприятие «Алникор Минерал Продукт», Беларусь)	N _{общ.} – не менее 60 г/л; В – не менее 150 г/л; аминокислоты – 0,5-1%	Зеленные культуры защищенного грунта	+
Удобрение «ЭлияХим», марка – Хела-Старт, Fe – 5,5% ДТПА, раствор, р., ООО «ЭлияХим», Беларусь (Производитель: ООО «ЭлияХим», Беларусь)	Fe(ДТПА) – не менее 5,5%	Зеленные культуры защищенного грунта	+
Удобрение ЭлияХим марка «ХелаСтарт Mn – 6,5% ЭДТА, раствор», р., ООО «ЭлияХим», Беларусь (Производитель: ООО «ЭлияХим», Беларусь)	Mn(ЭДТА) – не менее 6,5%	Зеленные культуры защищенного грунта	+
Удобрение ЭлияХим марка «ХелаСтарт Zn – 7,5% ЭДТА, раствор», р., ООО «ЭлияХим», Беларусь (Производитель: ООО «ЭлияХим», Беларусь)	Zn(ЭДТА) – не менее 7,5%	Зеленные культуры защищенного грунта	+
ЭКОСТИМ ЦИНК, ВРК, ООО «ШАУЭР ГРУПП», Беларусь (Производитель: ООО «ШАУЭР ГРУПП», Беларусь)	N – не менее 30 г/л; Zn – не менее 150 г/л	Кукуруза	
Органические удобрения			
Удобрение органическое «Эко-Дар», однородная структурированная масса, ОАО «Пружанский молочный комбинат», Беларусь (Производитель: ОАО «Пружанский молочный комбинат», Беларусь)	Массовая доля сухого вещества – 12-65%; массовая доля органического вещества на сухое вещество – не менее 40%. Массовая доля на сухое вещество, %: N _{общ.} – не менее 1; P ₂ O ₅ – не менее 1; K ₂ O – не менее 0,1	Кукуруза	
Удобрения на основе гуминовых кислот			
Органо-минеральное удобрение Энерген-аква, марка А, Ж, АО «ТПК Техноэкспорт», Россия (Производитель: ООО «ЦСП Техноэкспорт», Россия)	Калиевые соли гуминовых кислот – 8±0,5%	Картофель, тыквенные овощные культуры открытого грунта, плодовые семечковые и косточковые, ягодные, многолетние и однолетние цветочно-декоративные растения открытого грунта (предпосевная обработка); комнатные растения	Л
РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ			
Микроудобрения			
ГИСИНАР БОР, ВР, ООО «ШАУЭР ГРУПП», Беларусь (Производитель: ООО «ШАУЭР ГРУПП», Беларусь)	N – 50±5 г/л; В – 150±15 г/л	Кукуруза, зернобобовые культуры	
ЭКОСТИМ МАРГАНЕЦ, ВРК, ООО «ШАУЭР ГРУПП», Беларусь (Производитель: ООО «ШАУЭР ГРУПП», Беларусь)	N – не менее 30 г/л; Mn – не менее 160 г/л	Рапс и другие крестоцветные, лен	

УТОЧНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ			
<i>Микроудобрения</i>			
ГИСИНАР-М, ВР , Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем», Беларусь (Производитель: ООО «ШАУЭР ГРУПП», Беларусь)	Zn – не менее 13 г/л; Cu – не менее 13 г/л; В – не менее 13 г/л; сополимер акрилата натрия и акриламида	Лен (предпосевная обработка семян)	

УДОБРЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ФАСОВАНИЯ	
Азотные удобрения	
Карбамид прилированный, Г, ОАО «Гродно Азот», Беларусь (Производитель: ОАО «Гродно Азот», Беларусь)	УП «АзотХимФортис», Беларусь ТУ ВУ 591020810.013-2017 Регистрация до 31.12.2031
Сульфат аммония, Кристаллы, ОАО «Гродно Азот», Беларусь (Производитель: ОАО «Гродно Азот», Беларусь)	УП «АзотХимФортис», Беларусь ТУ ВУ 591020810.013-2017 Регистрация до 31.12.2031
Калийные удобрения	
Калий хлористый (марки: гранулированный), ССП, ОАО «Беларуськалий», Беларусь (Производитель: ОАО «Беларуськалий», Беларусь)	УП «АзотХимФортис», Беларусь ТУ ВУ 591020810.013-2017 Регистрация до 13.05.2026
Органоминеральные удобрения	
Органоминеральное удобрение «Универсальное» марка 1, Г, ОАО «Буйский химический завод», Россия (Производитель: ОАО «Буйский химический завод», Россия)	ООО «ИНТЕРРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 06.06.2028
Органоминеральное удобрение «Универсальное» марка 2, Г, ОАО «Буйский химический завод», Россия (Производитель: ОАО «Буйский химический завод», Россия)	ООО «ИНТЕРРОС», Беларусь ТУ ВУ 101277625.002-2017 Регистрация до 06.06.2028
ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ/ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УДОБРЕНИЯ	
Прежнее название	Новое название
Удобрение «Экогум» марка Медь, ВР, УП «БЕЛУНИВЕРСАЛПРОДУКТ», Беларусь (Производитель: УП «БЕЛУНИВЕРСАЛПРОДУКТ», Беларусь; ООО «ВПК-актив», Беларусь; Частное предприятие «ЧервеньАГРО», Беларусь)	Удобрение «Экогум» марка Медь, ВР, Частное предприятие «ЧервеньАГРО», Беларусь, (Производитель: УП «БЕЛУНИВЕРСАЛПРОДУКТ», Беларусь; Частное предприятие «ЧервеньАГРО», Беларусь)
Удобрение «Экогум» марка Медь, Марганец, ВР, УП «БЕЛУНИВЕРСАЛПРОДУКТ», Беларусь (Производитель: УП «БЕЛУНИВЕРСАЛПРОДУКТ», Беларусь; ООО «ВПК-актив», Беларусь; Частное предприятие «ЧервеньАГРО», Беларусь)	Удобрение «Экогум» марка Медь, Марганец, ВР, Частное предприятие «ЧервеньАГРО», Беларусь, (Производитель: УП «БЕЛУНИВЕРСАЛПРОДУКТ», Беларусь; Частное предприятие «ЧервеньАГРО», Беларусь)

